ЛП-№(004813)-(РГ-RU) от 13.07.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Глидиаб, 80 мг, таблетки

Действующее вещество: гликлазид

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Глидиаб, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Глидиаб.

3. Прием препарата Глидиаб.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Глидиаб.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Глидиаб, и для чего его применяют

Препарат Глидиаб содержит действующее вещество гликлазид, относящееся к группе: средства для лечения сахарного диабета; гипогликемические (для снижения уровня глюкозы крови) средства, кроме инсулинов; производные сульфонилмочевины.

Показания к применению

Препарат Глидиаб применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения сахарного диабета 2 типа (при недостаточной эффективности диетотерапии, физических нагрузок и снижения массы тела).

Способ действия препарата Глидиаб

Гликлазид снижает концентрацию глюкозы в крови, стимулируя секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы. Инсулин – это гормон, который снижает концентрацию глюкозы в крови за счет улучшения ее проникновения в клетки. Гликлазид снижает риск образования сгустков крови (тромбов) в мелких сосудах.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Глидиаб

Противопоказания

Не принимайте препарат Глидиаб:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

- если у Вас аллергия на гликлазид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), или на другие препараты, относящиеся к группе производных сульфонилмочевины, или на другие аналогичные препараты (сульфаниламиды);
- если у Вас сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый);
- если у Вас диабетический кетоацидоз (состояние, при котором в крови накапливаются вещества, называемые «кетоновыми телами», сопровождается тошнотой, рвотой, болями в животе, появлением сахара и «кетоновых тел» в моче) или более тяжелые состояния: диабетическая прекома (снижение артериального давления, нарушение дыхания, появление заторможенности, резкой слабости и сонливости) или кома (потеря сознания);
- если у Вас тяжелое нарушение функции почек или печени;
- если Вы принимаете препараты для лечения грибковых инфекций (миконазол);
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Глидиаб проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Вам следует соблюдать план лечения, назначенный врачом, чтобы достичь соответствующего уровня сахара (глюкозы) в крови. Это означает, что помимо регулярного приема таблеток, Вам необходимо соблюдать режим питания, выполнять физические упражнения и, при необходимости, снижать массу тела.

Обязательно сообщите Вашему врачу, прежде чем принимать препарат Глидиаб:

- если Ваш возраст 65 лет и старше (Вы относитесь к пациентам пожилого возраста);
- если Вы не соблюдаете режим питания (нерегулярное и (или) несбалансированное питание);
- если у Вас или у Ваших родственников отмечается такое наследственное заболевание как дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (врожденное заболевание, протекающее с разрушением эритроцитов), то при приеме гликлазида возможно снижение гемоглобина и разрушение эритроцитов (гемолитическая анемия); обратитесь к лечащему врачу до приема препарата Глидиаб;
- если у Вас имеются тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
- если у Вас снижена функция щитовидной железы (гипотиреоз), то есть щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, что может вызвать усталость или увеличение массы тела;
- если у Вас состояние, при котором гипофиз и (или) надпочечники не вырабатывают достаточное количество гормонов (гипофизарная и (или) надпочечниковая недостаточность);
- если у Вас нарушение функции почек или печени;
- если Вы получаете лечение глюкокортикостероидами (гормональные препараты);
- если Вы злоупотребляете алкоголем.

Во время лечения гликлазидом Ваш врач назначит регулярный мониторинг уровня сахара (глюкозы) в крови (и, возможно, в моче), а также уровня гликированного гемоглобина (HbA1c).

В первые несколько недель лечения может быть повышен риск избыточного снижения уровня сахара (глюкозы) в крови (гипогликемии). Поэтому необходимо особенно тщательное медицинское наблюдение.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Низкий уровень сахара (глюкозы) в крови (гипогликемия) может развиваться в следующих ситуациях:

- если Вы питаетесь нерегулярно, пропускаете приемы пищи (в том числе завтрак), поститесь;
- если Вы недоедаете или у Вас период голодания;
- если Вы изменяете свою диету;
- если Вы увеличиваете физическую активность, но при этом не увеличиваете потребление углеводов в достаточном количестве;
- если Вы употребляете алкоголь, особенно в сочетании с пропущенными приемами пищи;
- если Вы принимаете одновременно другие гипогликемические лекарственные препараты или растительные препараты;
- если Вы принимаете слишком большие дозы гликлазида;
- если у Вас определенные гормональные нарушения (нарушения функции щитовидной железы, гипофиза или коры надпочечников);
- если у Вас значительно снижена функция почек или печени;
- при совместном применении с некоторыми лекарственными препаратами.

При низком уровне сахара (глюкозы) в крови у Вас могут наблюдаться следующие симптомы: головная боль, ощущение сильного голода, тошнота, рвота, повышенная утомляемость, нарушение сна, возбуждение, агрессивность, снижение концентрации внимания, замедленная реакция, депрессия, спутанность сознания, нарушение зрения и речи, тремор, расстройства чувствительности, головокружение и ощущение беспомощности. Также могут наблюдаться следующие симптомы: повышенное потоотделение, «липкая» кожа, тревожность, быстрое или нерегулярное сердцебиение, повышение артериального давления, внезапная сильная боль в груди, которая может распространяться на соседние части тела, например, в левое плечо и левую руку (стенокардия).

Если уровень сахара (глюкозы) в крови продолжает снижаться, у Вас может возникнуть спутанность сознания (бред), судороги, потеря самоконтроля, поверхностное дыхание, замедленное сердцебиение и Вы можете потерять сознание.

В большинстве случаев симптомы, связанные с низким уровнем сахара (глюкозы) в крови, исчезают очень быстро после приема сахара (глюкозы) в какой-либо форме (например, таблетки глюкозы, кусочки сахара, сладкий сок или чай).

Поэтому Вы всегда должны иметь при себе сахар (глюкозу) в какой-либо форме (таблетки глюкозы, кусочки сахара). Следует помнить, что заменители сахара неэффективны. Если прием сахара (глюкозы) не помогает или если симптомы повторяются, обратитесь к Вашему лечащему врачу, или в медицинское учреждение, или службу скорой помощи. В ряде случаев симптомы, связанные с низким уровнем сахара (глюкозы) в крови, могут отсутствовать, быть менее очевидными или развиваться очень медленно, или Вы можете не понять вовремя, что уровень сахара (глюкозы) в крови резко снизился. Это возможно, если Вы пациент пожилого возраста, принимающий определенные лекарственные препараты (например, препараты, которые действуют на центральную нервную систему и бета-адреноблокаторы). В стрессовых ситуациях (например, несчастный случай, хирургическая операция, лихорадка) Ваш лечащий врач может временно перевести Вас на лечение инсулином.

Симптомы повышенного уровня сахара в крови (гипергликемии) могут возникать в случае, если гликлазид в недостаточной степени снизил уровень сахара в крови, если Вы не соблюдаете режим лечения, назначенный Вашим лечащим врачом, если Вы принимаете

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

препараты зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum*) или в особых стрессовых ситуациях. Симптомы гипергликемии могут включать жажду, частое мочеиспускание, сухость во рту, сухую зудящую кожу, кожные инфекции и снижение работоспособности. При возникновении данных симптомов обратитесь к Вашему лечащему врачу или работнику аптеки.

Изменение уровня глюкозы в крови (дисгликемия)

Изменения уровня глюкозы в крови (пониженный или повышенный уровень сахара в крови) могут возникать при совместном лечении гликлазидом и препаратами, относящимися к классу антибиотиков (фторхинолонами), особенно у пациентов пожилого возраста. В таких случаях Ваш лечащий врач напомнит Вам о важности регулярного измерения уровня глюкозы в крови.

Если у Вас или у Ваших родственников отмечается такое наследственное заболевание как дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (аномалия эритроцитов), то при приеме гликлазида возможно снижение уровня гемоглобина и разрушение эритроцитов (гемолитическая анемия). Обратитесь к Вашему лечащему врачу до применения препарата.

Порфирия

Были описаны случаи обострения порфирии при применении ряда других препаратов сульфонилмочевины у пациентов с порфирией (наследственные генетические нарушения с накоплением в организме порфиринов или предшественников порфиринов).

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Глидиаб

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Сахароснижающий эффект гликлазида может усиливаться, и могут наблюдаться симптомы пониженного уровня сахара (глюкозы) в крови при совместном применении со следующими лекарственными препаратами:

- другие препараты, снижающие уровень сахара (глюкозы) в крови, такие как пероральные противодиабетические препараты, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, или препараты инсулина;
- антибиотики (сульфаниламиды, кларитромицин), препараты для лечения высокого артериального давления или сердечной недостаточности (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, такие как каптоприл или эналаприл);
- препараты для лечения грибковых инфекций (миконазол, флуконазол);
- препараты для лечения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки (антагонисты Н2-рецепторов);
- препараты для лечения депрессии (ингибиторы моноаминоксидазы);
- болеутоляющие или противопростудные препараты (фенилбутазон, ибупрофен);
- препараты, содержащие этанол (спирт).

Сахароснижающий эффект гликлазида может быть ослаблен и может отмечаться повышение уровня сахара (глюкозы) в крови при совместном применении со следующими лекарственными препаратами:

- препараты для лечения нарушений центральной нервной системы (хлорпромазин);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

- препараты для уменьшения воспаления (глюкокортикостероиды), тетракозактид, препараты для лечения патологии бронхов и легких, препараты, применяемые в акушерстве;
- препараты для лечения астмы или используемые во время родов (сальбутамол, ритодрин, тербуталин для внутривенного введения);
- препараты для лечения заболеваний молочной железы, препараты, применяемые в гинекологии (даназол);
- препараты зверобоя продырявленного.

Сочетания препаратов, требующих особого внимания:

Колебания уровня глюкозы в крови (низкий уровень сахара в крови и высокий уровень сахара в крови) могут возникнуть при совместном применении препарата Глидиаб и антибиотиков из группы фторхинолонов, особенно у пациентов пожилого возраста. Необходимо учитывать важность контроля концентрации глюкозы в крови. Препарат Глидиаб может усиливать действие лекарственных препаратов, снижающих свертываемость крови (варфарин). Необходимо учитывать возможную необходимость коррекции дозы препаратов для снижения свертываемости крови. Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед началом приема других лекарственных препаратов. В случае госпитализации сообщите медицинскому персоналу, что Вы принимаете препарат Глидиаб.

Препарат Глидиаб с пищей, напитками и алкоголем

Препарат Глидиаб можно принимать с пищей и безалкогольными напитками.

Этанол (алкоголь) усиливает гипогликемию, ингибируя компенсаторные реакции, может способствовать развитию гипогликемической комы. Необходимо отказаться от приема лекарственных препаратов, в состав которых входит этанол, и употребления алкоголя.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Не принимайте препарат Глидиаб во время беременности. Инсулин является препаратом выбора для лечения сахарного диабета у беременных. Если Вы планируете беременность или сразу после выявления беременности, обратитесь к лечащему врачу для замены приема данного препарата на лечение инсулином.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Глидиаб в период грудного вскармливания. Необходимо немедленно проинформировать лечащего врача, если Вы кормите грудью или планируете начать кормление. Нельзя исключить риск попадания гликлазида в грудное молоко, что может привести к гипогликемии у ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Глидиаб не оказывает никакого или оказывает несущественное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Способность к концентрации и скорость реакции могут нарушаться, если уровень сахара в крови слишком низкий (гипогликемия), или слишком высокий (гипергликемия), или если в результате таких состояний появляются нарушения зрения. Следует иметь в виду, что Вы можете подвергнуть опасности себя или других (например, при управлении автомобилем или использовании механизмов).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, можете ли Вы водить машину и работать с механизмами, если:

- у Вас отмечаются частые эпизоды низкого уровня сахара в крови (гипогликемии),
- симптомы, свидетельствующие о низком уровне сахара в крови (гипогликемии), у Вас не проявляются или выражены слабо.

Препарат Глидиаб содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Глидиаб содержит натрий

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на таблетку, то есть, по сути, не содержит натрия.

3. Прием препарата Глидиаб

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза:

Доза препарата определяется лечащим врачом в зависимости от уровня сахара в крови и при необходимости – уровня сахара в моче. Изменение внешних факторов (снижение веса, изменение образа жизни, стресс) или улучшение контроля уровня сахара в крови могут потребовать изменения дозы гликлазида.

Начальная доза гликлазида должна составлять 40*–80 мг. В дальнейшем доза должна корректироваться до достижения адекватного гликемического контроля. При необходимости препарат следует принимать 2 раза в сутки. Повышение дозы производится поэтапно с периодом приема не менее 14 дней между этапами.

Разовая доза не должна превышать 160 мг (2 таблетки). Средняя суточная доза составляет 40*–320 мг.

Переход с приема другого гипогликемического лекарственного препарата на гликлазид

Гликлазид может применяться вместо другого перорального гипогликемического препарата. Как правило, переходного периода при этом не требуется. Начальная доза гликлазида составляет 40*–80 мг и затем должна корректироваться в зависимости от концентрации глюкозы в крови. Обратитесь к врачу для уточнения мер, направленных на предотвращение гипогликемии, вызванной усиленным (аддитивным) эффектом двух гипогликемических средств.

Комбинированный прием с другими гипогликемическими препаратами

Гликлазид может применяться в сочетании с бигуанидами, ингибиторами α-глюкозидазы или инсулином. Ваш лечащий врач подберет подходящую индивидуально Вам дозу каждого из препаратов. Если, несмотря на прием препарата в соответствии с рекомендациями врача, у Вас отмечается высокий уровень сахара в крови, Вам следует обратиться к лечащему врачу.

Лица пожилого возраста

Если Ваш возраст 65 лет и старше, рекомендовано начинать лечение гликлазидом с дозы 40* мг в день. Ваш врач поможет постепенно увеличить дозу в зависимости от результатов анализов. Между моментами повышения дозы гликлазида будут соблюдаться интервалы не менее 14 дней.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Пациенты с риском развития гипогликемии

– недостаточное или несбалансированное питание;

– тяжелые или плохо компенсированные эндокринные расстройства – гипофизарная и надпочечниковая недостаточность, гипотиреоз;

– отмена глюкокортикостероидов (ГКС) после их длительного приема и/или приема в высоких дозах;

– тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы – тяжелая ишемическая болезнь сердца, тяжелый атеросклероз сонных артерий, распространенный атеросклероз.

У таких пациентов рекомендуется начинать терапию с минимальной дозы 40*–80 мг лекарственного препарата.

* при необходимости применения препарата в указанной дозе следует применять препарат гликлазида других производителей (в связи с отсутствием риски у таблеток препарата Глидиаб).

Путь и (или) способ введения

Внутрь, во время основного приема пищи.

Если Вы приняли препарата Глидиаб больше, чем следовало

Если Вы приняли большее количество гликлазида, чем следовало, немедленно обратитесь к Вашему лечащему врачу, или в медицинское учреждение, или в службу скорой помощи. Признаками передозировки являются симптомы пониженного уровня сахара в крови (гипогликемия), описанные в разделе 2. Симптомы можно облегчить, если сразу принять сахар (от 4 до 6 кусочков) или напитки, содержащие сахар, после чего следует перекусить или поесть. Прием сахарозаменителей не способствует устранению гипогликемических симптомов.

Если пациент без сознания, необходимо немедленно сообщить об этом врачу и вызвать скорую помощь. Необходимо поступить таким же образом, если другой человек (например, ребенок) принял препарат непреднамеренно. Пациентам без сознания нельзя давать пищу или напитки. Следует убедиться, что всегда есть заранее проинформированный человек, который может вызвать врача в случае экстренной ситуации.

Если Вы забыли принять препарат Глидиаб

Важно принимать препарат каждый день, так как регулярное лечение более эффективно. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При пропуске одного и более приемов препарата нельзя принимать более высокую дозу в следующий прием, обычную дозу следует принять на следующий день.

Если Вы прекратили прием препарата Глидиаб

Поскольку, как правило, лечение диабета проводится постоянно, не прекращайте принимать препарат Глидиаб без предварительного обсуждения с лечащим врачом. Прекращение приема препарата может стать причиной повышения уровня сахара (глюкозы) в крови (гипергликемии) и увеличить риск развития осложнений, связанных с диабетом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно обратитесь к врачу, если у Вас возникнут какие-либо из следующих нежелательных реакций после приема этого препарата:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

- кожная сыпь, покраснение, зуд, крапивница, волдыри, ангионевротический отек (быстрый отек тканей век, лица, губ, рта, языка или горла, который может привести к затруднению дыхания). Кожная сыпь может прогрессировать до распространенного образования волдырей или шелушения кожи;

- развитие тяжелой реакции гиперчувствительности, первоначально проявляющейся симптомами, похожими на грипп, а также сыпью на лице, которая затем распространяется по всему телу с высокой температурой (DRESS-синдром).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Глидиаб

Наиболее частой нежелательной реакцией является пониженный уровень сахара в крови (гипогликемия)

Симптомы гипогликемии приведены в подразделе «Особые указания и меры предосторожности». Если не принять меры, то данные симптомы могут усугубиться до состояния сонливости, потери сознания и, возможно, комы. **Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью**, если прием сахара (глюкозы) не помогает, или снижение уровня сахара в крови (гипогликемия) продолжительное по времени, или симптомы гипогликемии повторяются после того, как Вы почувствовали себя лучше после употребления сахара (глюкозы).

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

- боль в животе;
- тошнота;
- рвота;
- расстройство желудка (диспепсия);
- диарея;
- запор.

Прием препарата во время приема пищи позволяет избежать этих симптомов или минимизировать их.

Реже наблюдались следующие нежелательные реакции:

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей

- нарушение функции печени и повышение уровня «печеночных» ферментов, которые могут вызывать пожелтение кожи и глаз (желтуха);

- воспалительное заболевание печени (гепатит) (единичные случаи).

Если Вы обнаружили у себя такие нарушения, немедленно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Симптомы обычно исчезают после прекращения приема препарата. Ваш лечащий врач примет решение о том, следует ли прекращать лечение.

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы

- снижение количества клеток в крови (например, тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов), состояние, характеризующееся резким уменьшением или отсутствием гранулоцитов (агранулоцитоз), снижение содержания всех форменных элементов в периферической крови (панцитопения), заболевание, при котором происходит ускоренное разрушение эритроцитов (гемолитическая анемия), что может привести к появлению бледности, увеличению времени кровотечения, кровоизлияниям, боли в горле и лихорадке. Как правило, данные симптомы исчезают при прекращении лечения.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Нарушения со стороны органа зрения

- кратковременное преходящее нарушение зрения, особенно в начале лечения. Данное явление связано с изменениями уровня сахара (глюкозы) в крови.

Нежелательные реакции, характерные при применении производных сульфонилмочевины

- снижение содержания эритроцитов в крови (эритроцитопения);
- состояние, характеризующееся резким уменьшением или отсутствием гранулоцитов (агранулоцитоз);
- заболевание, при котором происходит ускоренное разрушение эритроцитов (гемолитическая анемия);
- снижение содержания всех форменных элементов в периферической крови (панцитопения);
- воспаление стенок мелких сосудов кожи и подкожной клетчатки, вызванное аллергической реакцией (аллергический васкулит);
- снижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия);
- усиление действия ферментов, вырабатываемых печенью (повышение активности «печеночных» ферментов);
- нарушение функции печени (например, с нарушением оттока желчи (холестазом)) и пожелтением кожи, слизистых оболочек и белков глаз из-за накопления в организме пигмента желчи – билирубина (желтухой)) и гепатит (воспаление печени), которые обычно исчезают после прекращения приема препаратов производных сульфонилмочевины, но в отдельных случаях приводили к жизнеугрожающему нарушению функции печени.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Глидиаб

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Глидиаб содержит

Действующим веществом является гликлазид.

Каждая таблетка содержит 80 мг гликлазида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), крахмал картофельный, гипромеллоза, магния стеарат, тальк, карбоксиметилкрахмал натрия.

Препарат Глидиаб содержит лактозу, натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Глидиаб и содержимое упаковки

Препарат представляет собой круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета, с фаской.

По 10, 15 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 4 контурные ячейковые упаковки по 15 таблеток, или 2 контурные ячейковые упаковки по 30 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.06.2026 № 12883
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).