ЛП-№(001074)-(РГ-RU) от 18.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Диклофенак ретард-Акрихин, 100 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: диклофенак натрия

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Диклофенак ретард-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Диклофенак ретард-Акрихин.

3. Прием препарата Диклофенак ретард-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Диклофенак ретард-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Диклофенак ретард-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Диклофенак ретард-Акрихин содержит действующее вещество диклофенак натрия, относящееся к группе: противовоспалительные и противоревматические препараты; нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты; производные уксусной кислоты и родственные соединения.

Особенностью препарата Диклофенак ретард-Акрихин является постепенное высвобождение действующего вещества из таблетки и, соответственно, более длительное действие препарата.

Показания к применению

Препарат Диклофенак ретард-Акрихин применяется у взрослых в возрасте от 18 лет при:

- воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит и другие спондилоартропатии, остеоартроз, бурсит, тендовагинит;
- заболеваниях позвоночника, сопровождающихся болевым синдромом (люмбаго, ишиалгия, оссалгия, невралгия, миалгия, артралгия, радикулит);
- посттравматических и послеоперационных болевых синдромах, сопровождающихся воспалением (например, в стоматологии и ортопедии);
- альгодисменорее;
- воспалительных процессах в малом тазу, в т. ч. аднексит.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент применения, на прогрессирование заболевания не влияет.

Способ действия препарата Диклофенак ретард-Акрихин

Препарат Диклофенак ретард-Акрихин уменьшает симптомы воспаления (противовоспалительное действие) и боли (анальгезирующее действие), снижает повышенную температуру тела (жаропонижающее действие) и способствует уменьшению тромбообразования (антиагрегантное действие). Эффекты препарата обусловлены его способностью блокировать циклооксигеназы 1 и 2, тем самым нарушая метаболизм арахидоновой кислоты и синтез молекул простагландинов в очаге воспаления.

При ревматических заболеваниях противовоспалительное и анальгезирующее действие диклофенака способствует значительному уменьшению выраженности боли, утренней скованности, припухлости суставов, что улучшает функциональное состояние сустава.

При травмах, в послеоперационном периоде диклофенак уменьшает болевые ощущения и воспалительный отек.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы относительно действия препарата Диклофенак ретард-Акрихин или причин, по которым данный лекарственный препарат был Вам назначен, обратитесь за консультацией к своему лечащему врачу.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Диклофенак ретард-Акрихин

Противопоказания

Не принимайте препарат Диклофенак ретард-Акрихин:

- если у Вас аллергия на диклофенак натрия, другие нестероидные противовоспалительные препараты или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас полное или неполное сочетание бронхиальной астмы (заболевание легких), ангионевротического отека (опасная аллергическая реакция), крапивницы (волдыри и зуд кожи), острого ринита (насморк), рецидивирующего полипоза слизистой оболочки носа или околоносовых пазух и когда-либо зарегистрированной непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов;
- если у Вас обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечения из органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), перфорация органов ЖКТ;
- если у Вас воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) в фазе обострения;
- если у Вас сильно нарушена функция печени (нарушение функции печени тяжелой степени);
- если у Вас активные заболевания печени;
- проблемы с почками (почечная недостаточность) (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 15 мл/мин/1,73 м^2);
- если у Вас подтвержденный повышенный уровень калия в крови (гиперкалиемия);
- если у Вас проблемы с сердцем (хроническая сердечная недостаточность II–IV функциональный класс по классификации NYHA);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- если у Вас клинически подтвержденная ишемическая болезнь сердца (заболевание, при котором сердце недостаточно снабжается кислородом);
- если у Вас есть заболевания сосудов головного мозга (цереброваскулярные заболевания), заболевания периферических артерий;
- если у Вас повышенный риск артериальных тромбозов и тромбоэмболий, либо неконтролируемая артериальная гипертензия;
- если у Вас есть состояния, сопровождающиеся риском развития кровотечений;
- если Вам планируется провести или недавно было проведено аортокоронарное шунтирование;
- если Вы беременны (срок беременности более 20 недель);
- если Вы кормите грудью;
- если у Вас наследственная непереносимость лактозы, недостаточность лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция (т.к. лекарственная форма содержит лактозу);
- если Ваш возраст младше 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Диклофенак ретард-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

До начала приема препарата Диклофенак ретард-Акрихин обязательно сообщите врачу:

- если у Вас когда-либо наблюдались патологии со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как язва желудка, кровотечение или черный стул, либо Вы испытывали дискомфорт в желудке или изжогу после приема противовоспалительных препаратов в прошлом;
- если у Вас выявлена хеликобактерная инфекция, воспаление толстой кишки (язвенный колит) или желудочно-кишечного тракта (болезнь Крона);
- если Вы недавно перенесли или планируете проведение операции на желудке или кишечнике;
- если Вы используете препарат Диклофенак ретард-Акрихин одновременно с другими противовоспалительными лекарственными средствами (включая ацетилсалициловую кислоту, глюкокортикостероиды), антикоагулянтами или препаратами для лечения депрессии (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) (см. подраздел «Другие препараты и препарат Диклофенак ретард-Акрихин»);
- если у Вас существуют проблемы с печенью или почками;
- если у Вас выявлено нарушение свертываемости крови или другие заболевания крови, включая редкое заболевание печени, называемое порфирия;
- если у Вас бронхиальная астма (заболевание легких);
- если у Вас сезонный аллергический ринит;
- если у Вас имеется отек слизистой оболочки носовой полости (в том числе с носовыми полипами);
- если у Вас хроническая обструктивная болезнь легких;
- если у Вас хронические инфекционные заболевания дыхательных путей;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- если у Вас было диагностировано заболевание сердца или кровеносных сосудов (включая неконтролируемое повышение артериального давления, застойную сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца или атеросклероз периферических артерий), так как лечение препаратом Диклофенак ретард-Акрихин обычно не рекомендуется при подобных состояниях;
- если у Вас было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание (см. выше) или имеются значительные факторы риска развития осложнений, такие как высокое артериальное давление, очень высокий уровень жиров (холестерин, триглицериды) в крови, диабет, а также если Вы курите или злоупотребляете алкоголем. Как правило, важно принимать самую низкую дозу препарата Диклофенак ретард-Акрихин, которая снимает боль и (или) отек, в течение наименьшего периода времени, чтобы снизить риск развития побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы;
- если Вы старше 65 лет.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите об этом лечащему врачу, прежде чем принимать препарат Диклофенак ретард-Акрихин в форме таблеток с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой.

Если во время лечения препаратом Диклофенак ретард-Акрихин у Вас возникнут какие-либо признаки или симптомы нарушения функции сердца или кровеносных сосудов, такие как боль в груди, одышка, слабость или невнятность речи, немедленно обратитесь к врачу.

В очень редких случаях пациенты, принимающие препарат Диклофенак ретард-Акрихин, как и в случае использования других противовоспалительных препаратов, могут испытывать тяжелые кожные аллергические реакции (см. раздел 4).

Препарат Диклофенак ретард-Акрихин может облегчать симптомы инфекции (например, головную боль, высокую температуру), следовательно, применение препарата затрудняет обнаружение инфекции и назначение соответствующего лечения. Если Вы плохо себя чувствуете и Вам необходимо обратиться к врачу, не забудьте сообщить, что Вы принимаете препарат Диклофенак ретард-Акрихин.

Не принимайте препарат Диклофенак ретард-Акрихин вместе с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2) (например, нимесулид), поскольку это повысит риск развития нежелательных реакций.

Дети

Препарат противопоказан детям в возрасте от 0 до 18 лет (см. раздел 2. «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат Диклофенак ретард-Акрихин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе:

- препарат, используемый для лечения грибковых инфекций (вориконазол);
- препарат для лечения расстройств психики (литий);
- дигоксин (препарат, назначаемый при заболеваниях сердца);
- препараты, применяемые для увеличения количества мочи (диуретики);
- препараты, используемые для снижения артериального давления и лечения сердечной недостаточности (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или бета-блокаторы);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- препараты, в основном применяемые у пациентов после трансплантации органов (циклоспорин, такролимус);
- триметоприм (препарат для профилактики или лечения инфекций мочевыводящих путей);
- антибактериальные препараты, используемые для лечения инфекций (хинолоны);
- другие нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ацетилсалициловая кислота или ибупрофен;
- препараты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (антикоагулянты, антиагреганты);
- препараты для лечения депрессии (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина);
- гормональные препараты, используемые для уменьшения признаков воспаления (глюкокортикостероиды);
- некоторые препараты для лечения диабета (такие как метформин);
- метотрексат (препарат для лечения некоторых видов рака или артрита);
- препарат, используемый при судорогах (фенитоин);
- антибиотик, используемый для лечения бактериальных инфекций (рифампицин).

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Как и в случае с другими противовоспалительными препаратами, не принимайте препарат Диклофенак ретард-Акрихин в форме таблеток с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой, во время беременности на сроке после 20 недель, так как это может навредить еще не рожденному ребенку и вызвать проблемы при родах.

Если Вы кормите грудью, сообщите об этом своему врачу.

Вам не следует кормить грудью, если Вы принимаете препарат Диклофенак ретард-Акрихин, так как это может нанести вред Вашему ребенку.

Лечащий врач обсудит с Вами потенциальный риск применения препарата Диклофенак ретард-Акрихин во время беременности или кормления грудью.

Женщины, планирующие беременность

Применение препарата Диклофенак ретард-Акрихин может осложнить течение беременности. Вам не следует принимать препарат Диклофенак ретард-Акрихин в форме таблеток с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой, если Вы планируете беременность, или если у Вас трудности с наступлением беременности за исключением случаев, когда это необходимо.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Диклофенак ретард-Акрихин может вызывать головокружение, сонливость, нарушения зрения или ощущение вращения (вертиго). Поэтому убедитесь, что Вы знаете, как Вы реагируете на препарат, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Препарат Диклофенак ретард-Акрихин содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

3. Прием препарата Диклофенак ретард-Акрихин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

По 100 мг 1 раз в сутки.

При альгодисменорее – до 150 мг/сут на протяжении не более 1–2 дней.

При приеме 100 мг таблеток пролонгированного действия при необходимости увеличения суточной дозы до 150 мг/сут можно дополнительно принимать по 1 обычной таблетке (50 мг). Максимальная суточная доза (по всем показаниям) 150 мг.

Если у Вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы или высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, длительное применение препарата должно проводиться с осторожностью и Ваш врач не назначит Вам дозу препарата выше 100 мг.

Если у Вас имеются нарушения функции почек и скорость клубочковой фильтрации менее 15 мл/мин/1,73 м^2, Ваш лечащий врач примет решение о невозможности принимать данный препарат.

Путь и (или) способ введения

Принимайте препарат внутрь, проглатывая таблетки целиком и запивая небольшим количеством воды.

Желательно принимать таблетки во время или после еды.

Нельзя делить или разжевывать таблетки.

Продолжительность терапии

Строго соблюдайте рекомендации лечащего врача.

Если Вы принимаете препарат Диклофенак ретард-Акрихин дольше нескольких недель, Вам необходимо посещать лечащего врача для проведения регулярных осмотров, чтобы убедиться в отсутствии незаметных для Вас нежелательных эффектов.

Если у Вас возникли вопросы по поводу длительности приема препарата Диклофенак ретард-Акрихин, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если Вы приняли препарата Диклофенак ретард-Акрихин больше, чем следовало

Если Вы случайно приняли слишком большую дозу препарата Диклофенак ретард-Акрихин, **сообщите об этом лечащему врачу или работнику аптеки, либо незамедлительно обратитесь в отделение неотложной медицинской помощи.**

Вам может потребоваться медицинская помощь.

Если Вы забыли принять препарат Диклофенак ретард-Акрихин

Если Вы забыли принять дозу препарата, примите ее, как только вспомните об этом. Если же уже пора принимать следующую дозу, просто примите следующую таблетку в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Если Вы прекратили прием препарата Диклофенак ретард-Акрихин

Не прекращайте прием препарата Диклофенак ретард-Акрихин, пока врач не скажет Вам об этом. Если у Вас есть вопросы о том, как долго принимать этот лекарственный препарат, проконсультируйтесь со своим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможно развитие тяжелых нежелательных реакций. Прекратите прием препарата Диклофенак ретард-Акрихин и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения признаков любой из следующих серьезных нежелательных реакций:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- внезапная давящая боль в груди (может быть признаком инфаркта миокарда);
- одышка, затрудненное дыхание в положении лежа, отеки ступней и/или голеней (признаки сердечной недостаточности).

Эти серьезные нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы возникали преимущественно у пациентов, которые принимали диклофенак в высокой суточной дозе (150 мг) в течение длительного времени.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- затруднение дыхания или глотания, сыпь, зуд, крапивница, головокружение, включая снижение артериального давления и шок (признаки гиперчувствительности и анафилактических/анафилактоидных реакций);
- рвота кровью, черный стул (мелена) или стул с кровью (признаки желудочно-кишечного кровотечения);
- диарея с примесью крови;
- боль в животе, тошнота (признаки язвы желудка и/или кишечника, которая может осложниться кровотечением, сужением просвета органа (стеноз), перфорацией или воспалением брюшины (перитонит).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- слабость, бледность кожи с желтоватым оттенком, уменьшение количества красных клеток крови по результатам лабораторных анализов (признаки гемолитической анемии);
- слабость, бледность, образование кровоподтеков, частые инфекции, уменьшение количества всех клеток крови по результатам лабораторных анализов (признаки апластической анемии);
- высокая температура, частые инфекции, постоянные боли в горле (признаки агранулоцитоза);
- отек лица, губ, языка или горла (ангионевротический отек);
- внезапная сильная головная боль, тошнота, головокружение, утрата способности говорить или нарушение речи, слабость или паралич конечностей, или лица (признаки острого нарушения мозгового кровообращения);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- скованность мышц шеи, тошнота, рвота, головная боль (признаки асептического менингита);
- внезапное затруднение дыхания (одышка) и ощущение стеснения в груди со свистящими хрипами или кашлем; лихорадка (признаки пневмонита);
- гриппоподобные симптомы, ощущение усталости, боли в мышцах, повышение активности «печеночных» ферментов в крови по результатам лабораторных анализов (признаки нарушений со стороны печени, включая молниеносный гепатит, некроз печени, печеночную недостаточность);
- образование пузырей на коже (признаки буллезного дерматита);
- покраснение кожи, сыпь с образованием пузырей на коже и слизистых оболочках, воспаление кожи с ее отслаиванием и слущиванием (признаки многоформной эритемы, или, если присутствует лихорадка, синдрома Стивенса-Джонсона или токсического эпидермального некролиза – синдрома Лайелла);
- кожная сыпь с отслаиванием или слущиванием кожи (признаки эксфолиативного дерматита);
- отеки, чувство слабости, нарушения мочеиспускания (признаки острой почечной недостаточности);
- увеличение или уменьшение количества выделяемой мочи, сонливость, спутанность сознания, тошнота (признаки тубуло-интерстициального нефрита);
- резкое уменьшение количества выделяемой мочи (признак папиллярного некроза).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- одновременное возникновение боли в груди и симптомов аллергических реакций (признаки синдрома Коуниса – аллергического острого коронарного синдрома).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Диклофенак ретард-Акрихин

Другие возможные нежелательные реакции перечислены ниже. Если эти нежелательные реакции будут протекать в тяжелой форме, обратитесь к врачу, фармацевту или медицинскому работнику.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- головокружение;
- ощущение вращения (вертиго);
- боль в животе (абдоминальная боль);
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- расстройство пищеварения (диспепсия);
- метеоризм;
- снижение аппетита;
- повышение активности «печеночных» ферментов (по данным анализа крови);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- кожная сыпь.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- ощущение сердцебиения;
- боль в груди.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- сонливость;
- внезапное затруднение дыхания (одышка) и ощущение стеснения в груди со свистящими хрипами или кашлем (признаки бронхиальной астмы);
- воспаление желудка (гастрит);
- воспаление печени (гепатит);
- пожелтение кожи и склер (желтуха);
- кожная сыпь по типу ожога крапивой (крапивница);
- отеки.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения);
- снижение количества лейкоцитов (лейкопения);
- дезориентация;
- депрессия;
- бессонница;
- кошмарные сновидения;
- раздражительность;
- психические нарушения;
- нарушение чувствительности, включая ощущение онемения (парестезии);
- расстройства памяти;
- мелкое подрагивание мышц (тремор);
- судороги;
- ощущение тревоги;
- нарушение зрения (затуманивание зрения);
- двоение в глазах (диплопия);
- нарушение слуха;
- шум в ушах;
- повышение артериального давления;
- воспаление сосудов (васкулит);
- воспаление слизистой оболочки ротовой полости (стоматит);
- воспаление языка (глоссит);
- повреждения пищевода;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- возникновение диафрагмоподобных структур в кишечнике;
- воспаление кишечника (колит) (неспецифический геморрагический колит, ишемический колит, обострение язвенного колита или болезни Крона);
- запор;
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит);
- искажение вкусовых ощущений (дисгевзия);
- экзема;
- покраснение кожи (эритема);
- кожный зуд;
- выпадение волос (алопеция);
- кожные реакции вследствие повышения чувствительности кожи к солнцу (фоточувствительность);
- мелкоточечная сыпь (пурпура);
- аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные мелкие кровеносные сосуды (капилляры) (пурпура Шенлейна-Геноха);
- появление крови в моче (гематурия);
- появление белка в моче (протеинурия);
- отеки (от отеков лица до накопления жидкости в брюшной полости), повышение артериального давления (признаки нефротического синдрома).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация:

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Диклофенак ретард-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке) для защиты от света и влаги.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Диклофенак ретард-Акрихин содержит

Действующим веществом является диклофенак натрия.

Каждая таблетка содержит 100,00 мг диклофенака натрия.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лудипресс ЛЦЕ [лактозы моногидрат 94,7-98,3 %, повидон 3-4 %] или лактозы моногидрат, повидон; гипромеллоза; целлюлоза микрокристаллическая; магния стеарат; кремния диоксид коллоидный; стеариновая кислота; *оболочка* – гипромеллоза, макрогол-6000, глицерол, тальк, титана диоксид (Е171), краситель железа оксид красный (Е172) или готовая пленочная оболочка красного цвета [гипромеллоза, титана диоксид (Е171), глицерол, макрогол 6000, тальк, краситель железа оксид красный (Е172)].

Препарат Диклофенак ретард-Акрихин содержит лактозу (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Диклофенак ретард-Акрихин и содержимое упаковки

Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-коричневого или розовато-коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые. Допускается наличие шероховатости. На изломе таблетки белого с кремоватым или желтоватым оттенком цвета.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3 или 4 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3.

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9439
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.