ЛП-№(000258)-(РГ-RU) от 23.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.03.2026 № 5463
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Пантопразол-Акрихин, 20 мг, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: пантопразол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 14 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Пантопразол-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Пантопразол-Акрихин.

3. Прием препарата Пантопразол-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Пантопразол-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Пантопразол-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Пантопразол-Акрихин содержит действующее вещество пантопразол, которое относится к группе: средства для лечения кислотозависимых заболеваний; противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ; ингибиторы протонного насоса. Пантопразол уменьшает количество соляной кислоты, вырабатываемой в желудке.

Показания к применению

Препарат Пантопразол-Акрихин применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни легкой степени выраженности (таких, как изжога, кислая отрыжка).

Способ действия препарата Пантопразол-Акрихин

Пантопразол блокирует образование соляной кислоты в желудке.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 14 дней, необходимо обратиться к врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.03.2026 № 5463
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

2. О чем следует знать перед приемом препарата Пантопразол-Акрихин

Противопоказания

Не принимайте препарат Пантопразол-Акрихин:

– если у Вас аллергия на пантопразол, другие замещенные бензимидазолы, или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

– если у Вас диспепсия невротического генеза;

– если Вы принимаете препараты для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), такие как атазанавир и нелфинавир, всасывание которых зависит от кислотности (pH) желудочного сока;

– если Ваш возраст младше 18 лет;

– если Вы беременны;

– если Вы кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Пантопразол-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если:

– у Вас непреднамеренная потеря веса, анемия (малокровие), желудочно-кишечное кровотечение, расстройство глотания, постоянная рвота или рвота с кровью;

– Вы ранее перенесли хирургическое вмешательство на желудочно-кишечном тракте или у Вас была язва желудка;

– Вы непрерывно лечите симптомы диспепсии (нарушения пищеварения) и/или изжогу в течение 4 недель и более;

– у Вас заболевания печени, в том числе желтуха и печеночная недостаточность (нарушение функции печени);

– у Вас другие серьезные заболевания, ухудшающие общее состояние здоровья.

Если Вы старше 55 лет, и у Вас недавно изменились симптомы или возникли новые, Вам следует проконсультироваться с врачом.

Вам не следует ожидать немедленного устранения симптомов недомогания. Облегчение симптомов возможно после приблизительно одного дня приема пантопразола. Также Вам необходимо учитывать, что для полного устранения изжоги может понадобиться приблизительно 7 дней.

Вам следует помнить, что при приеме препаратов, снижающих выработку кислоты в желудке, незначительно повышается риск развития желудочно-кишечных инфекций, возбудителями которых являются бактерии рода *Salmonella spp., Campylobacter spp., Clostridium. difficile.*

Вы должны немедленно обратиться к врачу при возникновении поражений кожи, особенно на участках, подвергшихся воздействию солнечных лучей, а также при наличии сопутствующей артралгии (боли в суставах). Ваш врач оценит необходимость прекращения лечения препаратом.

Если Вам необходимо сдать анализ крови, сообщите врачу, что Вы принимаете препарат Пантопразол-Акрихин.

Препарат Пантопразол-Акрихин предназначен для краткосрочного применения (до 4 недель). Не принимайте препарат Пантопразол-Акрихин дольше 4 недель без консультации с врачом, только врач может принять решение о необходимости длительного приема данного препарата

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.03.2026 № 5463
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

с последующим регулярным медицинским наблюдением.

При приеме препарата Пантопразол-Акрихин продолжительное время могут возникнуть следующие дополнительные, значительные риски:

– снижение абсорбции (всасывания) витамина B_{12}. Это следует учитывать, если у Вас снижены запасы витамина B_{12} в организме или имеются факторы риска снижения абсорбции витамина B_{12} при длительном лечении или при наличии соответствующих симптомов;

– влияние на переломы костей. Если Вы принимаете препарат в больших дозах длительное время (более года), может незначительно увеличиваться риск перелома бедра, запястья и позвоночника, особенно, если Вы старше 65 лет или у Вас имеется повышенный риск развития остеопороза. Если у Вас есть риск развития остеопороза, Вы должны получать лечение в соответствии с действующими рекомендациями, и у Вас должно быть соответствующее поступление витамина D и кальция в организм;

– гипомагниемия (снижение уровня магния в крови). Возможно развитие следующих симптомов: утомляемость, тетания (непроизвольные болезненные сокращения мышц), бред, судороги, головокружение и желудочковая аритмия (нарушение ритма сердца). Если Вам предстоит длительное лечение, или Вы принимаете препарат Пантопразол-Акрихин совместно с дигоксином или другими препаратами, которые могут вызвать снижение уровня магния в крови (например, диуретики), врач может назначить регулярные анализы крови, чтобы контролировать уровень магния перед началом лечения и во время лечения.

Дети

Препарат противопоказан детям в возрасте от 0 до 18 лет (см. раздел 2 «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат Пантопразол-Акрихин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Поскольку Пантопразол-Акрихин может оказывать влияние на эффективность других препаратов, сообщите Вашему врачу, если Вы принимаете:

– другие ингибиторы протонной помпы или блокаторы H_2-гистаминовых рецепторов. Одновременное применение препарата Пантопразол-Акрихин с этими препаратами без консультации с врачом не рекомендуется;

– препараты, такие как кетоконазол, итраконазол и позаконазол (применяются для лечения грибковых инфекций) или эрлотиниб (применяется для определенных типов рака), так как препарат Пантопразол-Акрихин может нарушить нормальную работу этих и других препаратов;

– варфарин и фенпрокумон, которые влияют на свертывание или разжижение крови. Вам могут понадобиться дополнительные исследования;

– препараты, применяемые для лечения ВИЧ-инфекции, такие как атазанавир и нелфинавир;

– метотрексат (применяется для лечения ревматоидного артрита, псориаза и рака). Если Вы применяете метотрексат, Ваш врач может временно прекратить Ваше лечение препаратом Пантопразол-Акрихин, потому что пантопразол может повысить уровень метотрексата в крови.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.03.2026 № 5463
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Беременность

Не принимайте препарат Пантопразол-Акрихин во время беременности.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Пантопразол-Акрихин, если Вы кормите грудью.

Фертильность

Данные о воздействии препарата Пантопразол-Акрихин на способность половозрелого организма воспроизводить потомство (фертильность) у человека отсутствуют. Доклинические исследования показали отсутствие эффекта на мужскую или женскую фертильность.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Пантопразол-Акрихин не оказывает или оказывает несущественное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Если Вы испытываете нежелательные реакции, такие как головокружение или нарушение зрения, воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Препарат Пантопразол-Акрихин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на таблетку, то есть, по сути, не содержит натрия.

3. Прием препарата Пантопразол-Акрихин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза составляет 20 мг (одна таблетка) в сутки.

Путь и (или) способ введения

Препарат Пантопразол-Акрихин принимают внутрь, до еды, не разжевывая и не измельчая, запивая достаточным количеством жидкости.

Продолжительность терапии

Для достижения положительной динамики в устранении симптомов может потребоваться прием препарата в течение 2–3 дней, однако, для полного устранения симптомов может потребоваться прием препарата в течение 7 дней. При ухудшении состояния в течение первых 3 дней лечения Вам следует проконсультироваться с врачом.

Прием препарата следует прекратить сразу после исчезновения симптомов.

Прием препарата без консультации с врачом не должен превышать 4 недель. Если в течение 2 недель непрерывного приема препарата положительная динамика отсутствует, обратитесь к врачу.

Не принимайте препарат Пантопразол-Акрихин в целях профилактики.

Если Вы приняли препарата Пантопразол-Акрихин больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком много таблеток препарата Пантопразол-Акрихин немедленно обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Симптомы передозировки неизвестны.

Если Вы забыли принять препарат Пантопразол-Акрихин

Примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.03.2026 № 5463
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата Пантопразол-Акрихин

Не прекращайте прием препарата без консультации с лечащим врачом или работником аптеки.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Пантопразол-Акрихин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения признаков перечисленных ниже тяжелых нежелательных реакций:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

– **серьезные аллергические реакции –** отек языка и/или горла, затруднения при глотании или дыхании, крапивница, аллергический отек лица (отек Квинке/ангионевротический отек), сильное головокружение с очень быстрым сердцебиением и сильным потоотделением (анафилактические реакции и анафилактический шок)

Неизвестно (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

– **серьезные кожные реакции** – Вы можете заметить одну или несколько следующих нежелательных реакций:

- образование волдырей на коже и быстрое ухудшение общего состояния, эрозия (в том числе незначительное кровотечение) в области глаз, носа, рта/губ или половых органов, повышенная чувствительность кожи или кожная сыпь, особенно на участках кожи, подверженных воздействию света/солнца. Возможны боли в суставах или гриппоподобные симптомы, жар, увеличение лимфатических узлов (например, в подмышечной впадине), отклонения результатов анализов крови в виде изменения количества некоторых типов лейкоцитов или уровней ферментов печени
- красноватые не приподнятые над кожей похожие на мишени или круглые пятна на теле, часто с центральными волдырями, шелушением кожи, язвами во рту, горле, носу, половых органах и глазах. Этим серьезным кожным высыпаниям могут предшествовать лихорадка и гриппоподобные симптомы (синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз)
- распространенная сыпь, лихорадка и увеличение лимфатических узлов (DRESS-синдром или синдром повышенной чувствительности к лекарственным препаратам)

– **другие серьезные реакции** – пожелтение кожи или белков глаз (серьезное повреждение клеток печени, желтуха) или лихорадка, сыпь, увеличение почек, иногда с болезненным мочеиспусканием, боль в пояснице (серьезное воспаление почек), что может привести к почечной недостаточности

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Пантопразол-Акрихин

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

– доброкачественные полипы желудка

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

– головная боль

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.03.2026 № 5463
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

– головокружение
– диарея
– тошнота
– рвота
– вздутие живота и метеоризм (газы)
– запор
– сухость во рту
– боль в животе и дискомфорт
– кожная сыпь, высыпания
– зуд
– дерматит
– чувство слабости, утомляемость или общее недомогание
– нарушение сна
– перелом бедренной кости, костей запястья или позвоночника

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

– нарушения вкуса
– нарушения зрения, такие как затуманивание зрения
– крапивница
– боль в суставах (артралгия)
– мышечные боли (миалгия)
– изменение веса
– повышение температуры тела
– отек конечностей (периферические отеки)
– аллергические реакции
– депрессия (включая обострения имеющихся расстройств)
– увеличение грудных желез у мужчин (гинекомастия)

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

– дезориентация (включая обострения имеющихся расстройств)

Неизвестно (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

– галлюцинации, спутанность сознания (особенно у пациентов, у которых указанные симптомы в анамнезе), а также возможное обострение симптомов при их существовании до начала терапии

– ощущение покалывания, ощущение «булавок и игл», ощущение жжения или онемения (парестезия)

– сыпь, возможно с болью в суставах

– воспаление в толстой кишке, которое вызывает постоянную водянистую диарею

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.03.2026 № 5463
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

(микроскопический колит)

– спазм мышц

– эректильная дисфункция

Нежелательные реакции, выявляемые с помощью анализов крови

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

– повышение активности печеночных ферментов (трансаминаз, γ-глутаминтрансферазы)

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

– повышение уровня билирубина

– повышение уровня жиров в крови (гиперлипидемия и повышенная концентрация липидов)

– резкое падение уровня циркулирующих гранулоцитарных лейкоцитов (агранулоцитоз), связанное с высокой температурой

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

– уменьшение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения), которое может вызвать более сильное кровотечение или кровоподтек, чем обычно

– уменьшение количества лейкоцитов (лейкопения), которое может привести к более частым инфекциям

– аномальное снижение количества эритроцитов и лейкоцитов, а также тромбоцитов (панцитопения)

Неизвестно (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

– снижение уровня натрия, магния, кальция или калия в крови (см. раздел 2)

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Пантопразол-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.03.2026 № 5463
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Пантопразол-Акрихин содержит

Действующим веществом является пантопразол.

Каждая таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, содержит 20 мг пантопразола (в виде натрия сесквигидрата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: натрия карбонат безводный, маннитол, кросповидон, повидон (тип К90), кальция стеарат; *защитная оболочка* – готовая пленочная оболочка бесцветная [гипромеллоза-2910, триацетин, тальк]; *кишечнорастворимая оболочка* – готовая пленочная оболочка желтого цвета [метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1], тальк, титана диоксид (Е171), оксид железа желтый (Е172), кремния диоксид коллоидный безводный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат]; триэтилцитрат.

Препарат Пантопразол-Акрихин содержит натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Пантопразол-Акрихин и содержимое упаковки

Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой.

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета. На поперечном разрезе ядро от белого до белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из фольги алюминиевой и пленки ПВХ/ПВДХ или пленки ПВХ/Аклар®, или комбинированного материала ОПА/АЛ/ПВХ.

1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

Адрес: 142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Тел./факс: +7 (495) 702-95-03

Электронная почта: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

Адрес: 142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.03.2026 № 5463
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

Адрес: 142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Тел./факс: +7 (495) 702-95-03

Электронная почта: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.