ЛП-№(001167)-(РГ-RU) от 01.10.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18494
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Лоперамид-Акрихин, 2 мг, капсулы

Действующее вещество: лоперамид

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Лоперамид-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Лоперамид-Акрихин.

3. Прием препарата Лоперамид-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Лоперамид-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Лоперамид-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Лоперамид-Акрихин содержит действующее вещество лоперамид, которое обладает противодиарейными свойствами и снижает моторику желудочно-кишечного тракта.

Фармакотерапевтическая группа: противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства; средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению

Препарат Лоперамид-Акрихин применяется у взрослых и детей в возрасте от 6 до 18 лет для:

- симптоматического лечения острой и хронической диареи (типа: аллергического, эмоционального, лекарственного, лучевого; при изменении режима питания и качественного состава пищи, при нарушении метаболизма и всасывания);
- в качестве вспомогательного лекарственного средства при диарее инфекционного характера;
- регуляции стула у пациентов с илеостомой (искусственное выходное отверстие из конечного отдела тонкой кишки).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18494
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Препарат Лоперамид-Акрихин применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для:

- симптоматического лечения острых эпизодов диареи, связанных с синдромом раздраженного кишечника (СРК).

Способ действия препарата Лоперамид-Акрихин

Лоперамид замедляет сокращение стенок кишечника и увеличивает время прохождения содержимого по кишечнику, повышает тонус анального сфинктера, уменьшая тем самым недержание каловых масс и позывы к дефекации.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Лоперамид-Акрихин

Противопоказания

Не принимайте препарат Лоперамид-Акрихин:

- если у Вас аллергия на лоперамид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы беременны в первом триместре;
- если у Вас фенилкетонурия (наследственное заболевание обмена веществ);
- если у Вас острая дизентерия, которая характеризуется стулом с примесью крови и высокой температурой;
- если у Вас язвенный колит (хроническое воспалительное заболевание толстой кишки) в стадии обострения;
- если у Вас бактериальный энтероколит (воспаление тонкого и толстого кишечника), вызванный микроорганизмами, в том числе *Salmonella, Shigella* и *Campylobacter*;
- если у Вас псевдомембранозный колит (острое инфекционное заболевание кишечника), связанный с приемом антибиотиков широкого спектра действия;
- Лоперамид-Акрихин не следует применять, когда необходимо избежать замедление сокращений стенок кишечника из-за возможного риска развития серьезных последствий, включая кишечную непроходимость, мегаколон (хроническое расширение толстой кишки с гипертрофией ее стенки, приводящее к нарушению двигательной функции, что вызывает развитие упорных постоянных запоров, стойкого метеоризма и болей в животе) и токсический мегаколон (острая форма вздутия толстой кишки);
- необходимо немедленно прекратить прием препарата Лоперамид-Акрихин при развитии кишечной непроходимости, запора или вздутия живота.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Лоперамид-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обязательно обсудите с врачом, если к Вам или Вашему ребенку применимо что-то из перечисленного ниже:

- Лечение диареи препаратом Лоперамид-Акрихин только симптоматическое. В некоторых случаях необходимо лечение причин диареи. Если симптомы остаются неизменными или ухудшаются, обратитесь к лечащему врачу.
- Если Вы страдаете от тяжелой диареи, Ваш организм теряет жидкость, сахар и соли больше обычного (особенно у детей). В таком случае Вы должны восполнить потерю жидкости (регидратация), для чего следует пить больше жидкости, чем обычно.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18494
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Проконсультируйтесь у лечащего врача или работника аптеки, какие регидратирующие растворы компенсируют потери жидкости, сахара и солей.

- Поскольку продолжительная диарея может быть показателем потенциально более серьезных состояний, не принимайте препарат в течение длительного периода времени, пока не будет выяснена основная причина диареи.
- При острой диарее, если клиническое улучшение не наблюдается в течение 48 часов, прекратите прием препарата и проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Сообщите врачу, если у Вас имеются заболевания печени. При заболеваниях печени некоторые нежелательные реакции могут проявляться в более тяжёлой форме.
- Если Вы являетесь носителем вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заметили признаки вздутия живота или кишечной непроходимости, немедленно прекратите лечение и обратитесь к лечащему врачу.
- Если Вы принимаете Лоперамид-Акрихин для контроля эпизодов диареи, связанных с ранее диагностированным синдромом раздраженного кишечника, и клиническое улучшение не наблюдается в течение 48 часов, прекратите прием лоперамида гидрохлорида и проконсультируйтесь с врачом. Пациентам также следует обратиться к врачу, если характер их симптомов меняется или если повторяющиеся эпизоды диареи продолжаются более 2 недель.
- Препарат Лоперамид-Акрихин следует принимать только по назначению врача (см. раздел 1) и никогда не превышать рекомендованную дозу (см. раздел 3). При передозировке лоперамида, действующего вещества препарата, у некоторых пациентов отмечались симптомы нарушения сердечной деятельности (например, учащённое сердцебиение или сбои сердечного ритма). Передозировка может выявить существующий синдром Бругада (генетически обусловленное кардиологическое состояние, характеризующееся различными нарушениями работы сердца, которые приводят к резкому повышению риска развития внезапной сердечной смерти). Лоперамид-Акрихин не следует использовать в течение длительного периода времени без наблюдения врача, пациенты не должны превышать рекомендуемую дозу и/или рекомендуемую продолжительность лечения.

Если Вы принимаете этот препарат для симптоматического лечения эпизодов острой диареи, связанных с синдромом раздраженного кишечника (СРК), соблюдайте следующие **дополнительные меры предосторожности**:

- Принимайте препарат для лечения симптомов СРК, только если ранее данный диагноз был поставлен врачом.
- Если Вам 40 лет и более, и если симптомы СРК не проявлялись в течение некоторого времени или если текущая симптоматическая картина отличается от предыдущих симптомов СРК, проконсультируйтесь с врачом перед приемом этого препарата.
- Проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата, если у Вас: кишечное кровотечение, сильный запор, тошнота или рвота, потеря аппетита или снижение массы тела, трудности или боль при мочеиспускании, высокая температура тела; если Вы недавно выезжали заграницу.

Если симптомы ухудшаются, если появляются новые симптомы, если характер симптомов меняется или если повторяющиеся эпизоды диареи продолжаются более двух недель, Вы должны незамедлительно обратиться к врачу.

Дети и подростки

Препарат Лоперамид-Акрихин не предназначен для применения у детей до 6 лет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18494
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 6 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Не давайте препарат Лоперамид-Акрихин детям в возрасте от 0 до 18 лет по показанию, симптоматическое лечение острых эпизодов диареи, связанных с синдромом раздраженного кишечника (СРК).

Другие препараты и препарат Лоперамид-Акрихин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете следующие препараты:

- хинидин (средство для лечения аритмии);
- ритонавир (противовирусное средство);
- итраконазол, кетоконазол (противогрибковые средства);
- гемфиброзил (средство для снижения уровня холестерина в крови);
- десмопрессин (средство для лечения некоторых заболеваний, сопровождающихся расстройствами мочеиспускания);
- препараты, имеющие схожие с лоперамидом фармакологические свойства (такие препараты могут усиливать действие лоперамида);
- препараты, увеличивающие скорость прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт (такие препараты могут уменьшать действие лоперамида).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не принимайте препарат Лоперамид-Акрихин во время беременности.

Препарат противопоказан к применению в первом триместре беременности.

Грудное вскармливание

Не кормите ребенка грудью во время приема препарата.

Препарат противопоказан к применению в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лоперамид-Акрихин оказывает слабое влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами, поскольку лоперамид может вызывать головокружение и другие нежелательные реакции, которые могут влиять на повышенную концентрацию внимания и быстроту психомоторных реакций. При появлении головокружения и других нежелательных реакций воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом в случае, если Вы планируете управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18494
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Препарат Лоперамид-Акрихин содержит лактозу и краситель солнечный закат желтый (Е110)

Препарат Лоперамид-Акрихин содержит лактозу. Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Лоперамид-Акрихин содержит краситель солнечный закат желтый (Е110), который может вызывать аллергические реакции, а также оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

3. Прием препарата Лоперамид-Акрихин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Острая диарея

Начальная доза — 2 капсулы (4 мг) для взрослых и 1 капсула (2 мг) для детей, далее по 1 капсуле (2 мг) после каждого акта дефекации в случае жидкого стула.

Хроническая диарея

Начальная доза — 2 капсулы (4 мг) в сутки для взрослых и 1 капсула (2 мг) для детей; далее начальная доза должна быть откорректирована таким образом, чтобы частота нормального стула составляла 1–2 раза в сутки, что обычно достигается при поддерживающей дозе от 1 до 6 капсул (2–12 мг) в сутки.

Максимальная суточная доза не должна превышать 6 капсул (12 мг); максимальная суточная доза у детей рассчитывается, исходя из массы тела (3 капсулы на 20 кг массы тела ребенка), но не должна превышать 6 капсул (12 мг).

Симптоматическое лечение острых эпизодов диареи, связанных с синдромом раздраженного кишечника (СРК)

Начальная доза составляет две капсулы (4 мг), затем по 1 капсуле (2 мг) после каждого жидкого стула или в соответствии с рекомендациями врача. Максимальная суточная доза не должна превышать 6 капсул (12 мг).

Применение у детей и подростков

Острая диарея

Начальная доза — 1 капсула (2 мг), далее по 1 капсуле (2 мг) после каждого акта дефекации в случае жидкого стула.

Хроническая диарея

Начальная доза — 1 капсула (2 мг); далее начальная доза должна быть откорректирована таким образом, чтобы частота нормального стула составляла 1–2 раза в сутки, что обычно достигается при поддерживающей дозе от 1 до 6 капсул (2–12 мг) в сутки.

Препарат у детей в возрасте от 6 лет следует применять под наблюдением взрослых.

Путь и (или) способ введения

Внутрь, капсулы следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая водой.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18494
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Продолжительность терапии

При нормализации стула или при отсутствии стула более 12 часов лечение лоперамидом следует прекратить.

Если Вы приняли препарата Лоперамид-Акрихин больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком большое количество препарата Лоперамид-Акрихин немедленно обратитесь за медицинской помощью.

При передозировке (в том числе при относительной передозировке из-за нарушения функции печени) могут появиться задержка мочеиспускания, нарушение моторики кишечника (паралитическая кишечная непроходимость), запор, признаки угнетения центральной нервной системы (ЦНС), такие как угнетение дыхания, непроходимость дыхательных путей, рвота с нарушением сознания, оцепенение (ступор), нарушение координации, сонливость, сужение зрачков (миоз), гипертонус мышц. Дети и пациенты с нарушением функции печени могут быть более чувствительны к влиянию препарата на ЦНС, чем взрослые.

При передозировке лоперамида (от 40 мг до 240 мг/сутки), действующего вещества препарата, у некоторых пациентов отмечались симптомы нарушения сердечной деятельности (например, учащённое сердцебиение, сбои сердечного ритма, обморок, остановка сердца).

Злоупотребление, неправильное применение и/или передозировка высокими дозами лоперамида может привести к клиническому проявлению синдрома Бругада (генетически обусловленное кардиологическое состояние, характеризующееся различными нарушениями работы сердца, которые приводят к резкому повышению риска развития внезапной сердечной смерти).

Если ребёнок принял большое количество капсул или у него наблюдаются какие-либо из перечисленных выше симптомов, немедленно обратитесь к врачу.

Если Вы забыли принять препарат Лоперамид-Акрихин

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Лоперамид-Акрихин

Лечение лоперамидом следует прекратить после нормализации стула или при отсутствии стула более 12 часов.

Также необходимо прекратить прием препарата и обратиться к Вашему лечащему врачу при отсутствии эффекта после 2 суток лечения.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если Вы отмечаете у себя следующие симптомы, прекратите приём данного лекарственного средства и немедленно обратитесь к врачу — Вам может потребоваться медицинская помощь:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- аллергические реакции, проявлениями которых могут быть отёк лица, языка и гортани (ангионевротический отек), затруднённое глотание, необъяснимое чихание, угнетение дыхания, которые могут сопровождаться высыпаниями на коже или крапивницей;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18494
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- сильный запор, боли в животе, выпячивание или вздутие живота, температура — эти симптомы могут быть вызваны перекрытием или вздутием кишечника (кишечная непроходимость, мегаколон);
- тяжелые кожные реакции (синдром Стивенса – Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и мультиформная эритема), признаками которых могут быть высыпания на коже в виде пузырей, зуд, шелушение или отслаивание кожи, повышенная температура тела.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- воспаление поджелудочной железы (острый панкреатит), при котором появляется сильная боль в животе, которая может отдавать в спину, тошнота, рвота, повышение температуры тела и вздутие живота.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Лоперамид-Акрихин

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головокружение;
- головная боль;
- запор;
- тошнота;
- избыточное образование газов в кишечнике (метеоризм).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- сонливость;
- боль в животе;
- дискомфорт в области живота;
- сухость во рту;
- боль в верхней части живота (в эпигастральной области);
- рвота;
- ощущение боли или дискомфорта в верхнем отделе живота (диспепсия);
- кожная сыпь.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- нарушение координации;
- угнетение сознания;
- напряжения мышц, при котором они остаются плотными и не расслабляются даже в покое (гипертонус);
- потеря сознания;
- состояние полного оцепенения и обездвиженности с отсутствием речи (ступор);
- сужение зрачка (миоз);
- вздутие живота;
- боль в языке (глоссалгия);
- кожный зуд;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18494
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- крапивница (появление сильно зудящих, плоско приподнятых бледно-розовых волдырей, сходных по виду с волдырями от ожога крапивой);
- задержка мочи;
- утомляемость.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Лоперамид-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и на контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в оригинальной упаковке (в пачке), при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Лоперамид-Акрихин содержит

Действующим веществом является лоперамид.

Каждая капсула содержит 2,0 мг лоперамида гидрохлорида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат.

Капсула твердая желатиновая: титана диоксид, краситель хинолиновый желтый, краситель солнечный закат желтый (Е110), желатин.

Препарат Лоперамид-Акрихин содержит лактозу (см. раздел 2).

Препарат Лоперамид-Акрихин содержит краситель солнечный закат желтый (Е110) (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Лоперамид-Акрихин и содержимое упаковки

Капсулы.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18494
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Капсулы № 4 желтого цвета. Содержимое капсул – порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

По 10 или 20 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки по 10 капсул, или 1 или 2 контурные ячейковые упаковки по 20 капсул вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

Телефон: +7 (495) 702-95-03

За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.