ЛП-№(004522)-(РГ-RU) от 29.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Омепразол-Акрихин, 20 мг, капсулы кишечнорастворимые

Действующее вещество: омепразол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Омепразол-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Омепразол-Акрихин.

3. Прием препарата Омепразол-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Омепразол-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Омепразол-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Омепразол-Акрихин относится к группе лекарственных средств, которые применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с повышенной кислотностью (средства для лечения кислотозависимых заболеваний; противоязвенные средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ); ингибиторы протонного насоса).

Препарат Омепразол-Акрихин содержит действующее вещество омепразол, которое снижает образование кислоты в желудке.

Показания к применению

Препарат Омепразол-Акрихин применяется у взрослых для лечения:

- язвы двенадцатиперстной кишки;
- язвы желудка;
- язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);
- язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванные *Helicobacter pylori* (в комбинации с назначенной врачом соответствующей антибактериальной терапией);
- рефлюкс-эзофагита (воспаление слизистой оболочки нижней трети пищевода, возникающее вследствие заброса содержимого желудка);
- симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ – хроническая болезнь, которая проявляется постоянно повторяющимся забросом содержимого

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

желудка или двенадцатиперстной кишки в пищевод из-за нарушения функции моторики и эвакуации; сопровождается болевыми ощущениями, отрыжкой с кислым привкусом или изжогой);

- диспепсии, связанной с повышенной кислотностью (болезненные ощущения или чувство тяжести в верхней части живота);
- синдрома Золлингера-Эллисона (заболевание, при котором в поджелудочной железе или в двенадцатиперстной кишке появляется доброкачественная опухоль, вырабатывающая гастрин – вещество, стимулирующее выработку желудочного сока).

Препарат Омепразол-Акрихин применяется у детей и подростков от 2 до 18 лет с массой тела не менее 20 кг для лечения:

- рефлюкс-эзофагита;
- симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Препарат Омепразол-Акрихин применяется у детей и подростков от 2 до 18 лет для лечения:

- язвы двенадцатиперстной кишки, вызванной *Helicobacter pylori*.

Способ действия препарата Омепразол-Акрихин

Омепразол относится к препаратам, понижающим образование кислоты в желудке. Поэтому при его приеме в желудке уменьшается образование кислоты, не происходит повреждения слизистой оболочки желудка и пищевода, происходит заживление язвы.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Омепразол-Акрихин

Противопоказания

Не принимайте препарат Омепразол-Акрихин, если у Вас:

- аллергия на омепразол, замещенные бензимидазолы (это вещества с определенной химической структурой, схожие с омепразолом) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- одновременный прием с эрлотинибом (лекарственное средство для лечения рака), позаконазолом (лекарственное средство для лечения грибковых заболеваний);
- непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции;
- дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы;
- не допускается применение препарата детьми в возрасте до 2 лет;
- не допускается применение препарата детьми в возрасте старше 2 лет по другим показаниям, кроме лечения рефлюкс-эзофагита и симптоматической гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни;
- не допускается применение препарата детьми в возрасте старше 4 лет по другим показаниям, кроме лечения рефлюкс-эзофагита, симптоматической гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни и язвы двенадцатиперстной кишки, вызванной *Helicobacter pylori*.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Омепразол-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

До приема препарата Омепразол-Акрихин обязательно сообщите врачу:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- если у Вас имеется или случался в прошлом остеопороз (медленный процесс разрушения костной ткани в организме, при котором увеличивается риск переломов);
- если Вы начали стремительно и без причины терять вес и/или испытываете проблемы с глотанием (дисфагия);
- если что-либо из перечисленного ниже произойдет с Вами до начала приема препарата Омепразол-Акрихин или во время его приема, то немедленно обратитесь к врачу: Вы без причины сильно теряете в весе и испытываете проблемы с глотанием; у вас боли в желудке или расстройство желудка; у Вас рвота с кровью; у Вас черные каловые массы;
- если Вы принимаете атазанавир и нелфинавир (лекарственные средства для лечения ВИЧ-инфекции), клопидогрел (лекарственное средство, уменьшающее образование тромбов);
- Вам необходимо сдать специальный анализ крови на хромогранин А.

Это важно для того, чтобы врач смог оценить, насколько Вам безопасно принимать данный препарат и потребуется ли соблюдение особых мер предосторожности.

Подробная информация об особых указаниях и мерах предосторожности, обусловленных нежелательными реакциями, которые могут возникать при применении препарата Омепразол-Акрихин, приведена в разделе 4 листка-вкладыша.

Дети и подростки

Препарат Омепразол-Акрихин:

- противопоказан детям в возрасте до 2 лет (см. раздел 2 листка-вкладыша «Противопоказания»);
- не давайте препарат детям в возрасте старше 2 лет по другим показаниям, кроме лечения рефлюкс-эзофагита и симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
- не давайте препарат детям в возрасте старше 4 лет по другим показаниям, кроме лечения рефлюкс-эзофагита, симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и язвы двенадцатиперстной кишки, вызванной *Helicobacter pylori*.

Другие препараты и препарат Омепразол-Акрихин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Омепразол способен изменять (увеличивать или уменьшать) эффекты других лекарственных препаратов. Это также может увеличить вероятность возникновения нежелательных реакций. Сообщите Вашему врачу, если вы принимаете перечисленные ниже лекарственные препараты:

- кетоконазол, итраконазол, позаконазол (лекарственные средства для лечения грибковых инфекций);
- эрлотиниб (лекарственное средство для лечения рака);
- дигоксин (лекарственное средство для лечения болезней сердца);
- атазанавир, нелфинавир и саквинавир (лекарственные средства для лечения ВИЧ-инфекции);
- диазепам (лекарственное средство для лечения тревоги, беспокойства, бессонницы);
- варфарин или другие антагонисты витамина К (лекарственные средства для уменьшения свертываемости крови и снижения образования тромбов);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- фенитоин (лекарственное средство для лечения эпилепсии);
- цилостазол (лекарственное средство для лечения перемежающейся хромоты);
- клопидогрел (лекарственное средство, уменьшающее образование тромбов);
- такролимус (лекарственное средство, которое применяется при пересадке органов и тканей);
- метотрексат (лекарственное средство для лечения рака).

Другие лекарственные препараты могут изменять (увеличивать или уменьшать) эффекты омепразола. Это также может увеличить вероятность возникновения нежелательных реакций. Сообщите Вашему врачу, если Вы принимаете перечисленные ниже лекарственные препараты:

- кларитромицин (антибиотик для лечения бактериальных инфекций);
- вориконазол (лекарственное средство для лечения грибковых инфекций);
- рифампицин (антибиотик для лечения туберкулеза);
- препараты зверобоя продырявленного (лекарственные средства для лечения легкой депрессии).

Препарат Омепразол-Акрихин с пищей, напитками и алкоголем

Рекомендации о приеме препарата указаны в разделе 3 листка-вкладыша.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата Омепразол-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Препарат Омепразол-Акрихин разрешен для применения при беременности.

Грудное вскармливание

Препарат Омепразол-Акрихин выделяется с грудным молоком, но в терапевтических дозах он вряд ли повлияет на ребенка. Если Вы кормите грудью, перед началом применения препарата Омепразол-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом. Ваш врач решит, можете ли Вы принимать препарат Омепразол-Акрихин.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Омепразол-Акрихин может вызывать головокружение, нечеткость зрения и сонливость. Поэтому убедитесь, что Вы знаете, как Вы реагируете на препарат, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом. При появлении головокружения, сонливости или нарушений зрения воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Препарат Омепразол-Акрихин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну капсулу, то есть, по сути, «не содержит натрия».

Препарат Омепразол-Акрихин содержит лактозы моногидрат и сахарозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

3. Прием препарата Омепразол-Акрихин

Доза

Всегда принимайте препарат Омепразол-Акрихин в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Взрослые

Язва двенадцатиперстной кишки

Если у Вас активная язва двенадцатиперстной кишки, рекомендуется принимать препарат Омепразол-Акрихин 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов. У большинства пациентов заживление язвы наступает в течение 2-х недель. В тех случаях, когда в течение 2-х недель полное заживление язвы не наступает, заживление достигается при последующем 2-х недельном приеме омепразола.

Если у Вас язва двенадцатиперстной кишки, мало восприимчивая к лечению, обычно назначают омепразол в дозировке 40 мг 1 раз в сутки; заживление язвы обычно наступает в течение 4 недель.

Для предотвращения рецидивов пациентам с язвой двенадцатиперстной кишки рекомендуют применять препараты, содержащие 10 мг омепразола. В случае необходимости дозу омепразола можно увеличить до 20–40 мг 1 раз в сутки.

Язва желудка

Рекомендуемая доза препарата Омепразол-Акрихин 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов. У большинства пациентов излечение наступает в течение 4 недель. В тех случаях, когда после первого курса приема препарата полное заживление не наступает, обычно назначают повторный 4-недельный курс лечения, в течение которого достигается заживление. Если у Вас язва желудка, мало восприимчивая к лечению, обычно назначают омепразол в дозировке 40 мг 1 раз в сутки; заживление обычно достигается в течение 8 недель. Для предотвращения рецидивов пациентам с язвой желудка рекомендуют препарат Омепразол-Акрихин в дозировке 20 мг 1 раз в сутки. В случае необходимости дозу можно увеличивать до 40 мг 1 раз в сутки.

НПВП ассоциированные (связанные с приемом лекарственных препаратов из группы НПВП, например, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и др.) язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки

При наличии НПВП ассоциированных язв желудка, двенадцатиперстной кишки или гастродуоденальных эрозиях у пациентов с продолжающейся терапией НПВП или после ее прекращения рекомендуемая доза препарата Омепразол-Акрихин 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов, у большинства пациентов излечение наступает в течение 4 недель. У тех пациентов, у которых не произошло излечение в течение начального периода терапии, заживление обычно достигается при повторном 4-х недельном приеме препарата. Для профилактики язв, эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки и симптомов диспепсии, связанных с приемом НПВП, рекомендованная доза препарата Омепразол-Акрихин 20 мг 1 раз в сутки.

Эрадикация Helicobacter pylori при язвенной болезни (процесс полного уничтожения бактерии Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка) (в комбинации с соответствующей антибактериальной терапией)

Режимы эрадикации *Helicobacter pylori* при язвенной болезни

Трехкомпонентная схема лечения:

Омепразол 20 мг + кларитромицин 500 мг + амоксициллин 1000 мг. Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение одной недели

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

или

Омепразол 20 мг + метронидазол 400 мг (или тинидазол 500 мг) + кларитромицин 250 мг. Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение одной недели

или

Омепразол 40 мг 1 раз в сутки + амоксициллин 500 мг + метронидазол 400 мг 3 раза в сутки в течение одной недели.

Двухкомпонентная схема лечения:

Омепразол 40–80 мг ежедневно + амоксициллин 1500 мг ежедневно (дозу следует делить на части) в течение двух недель. Во время клинических исследований применяли амоксициллин в суточной дозе 1,5–3 г, омепразол 40 мг 1 раз в сутки и кларитромицин 500 мг 3 раза в сутки в течение двух недель.

Для обеспечения полного заживления дальнейшее лечение проводить в соответствии с рекомендациями в разделах «Язва двенадцатиперстной кишки» и «Язва желудка».

В тех случаях, когда после прохождения курса лечения тест на *Helicobacter pylori* остается положительным, курс лечения может быть повторен.

Рефлюкс-эзофагит

Рекомендуемая доза препарата Омепразол-Акрихин 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов. У большинства пациентов излечение наступает в течение 4 недель. В тех случаях, когда после первого курса приема препарата полное излечение не наступает, обычно назначают повторный 4-недельный курс лечения, в течение которого достигается излечение.

Если у Вас тяжелая форма рефлюкс-эзофагита, рекомендуется омепразол 40 мг 1 раз в сутки; излечение обычно наступает в течение 8 недель.

Пациентам с рефлюкс-эзофагитом в стадии ремиссии назначают омепразол в дозировке 10 мг 1 раз в сутки в виде длительных курсов поддерживающей терапии. В случае необходимости дозу омепразола можно увеличить до 20–40 мг.

Симптоматическая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Рекомендуемая доза препарата Омепразол-Акрихин 20 мг 1 раз в сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов. Терапевтический эффект может достигаться при ежедневной дозе 10 мг, поэтому не исключается индивидуальный подбор дозы. Если после 4 недель лечения (омепразол 20 мг 1 раз в сутки) симптомы не исчезают, рекомендуется дополнительное обследование пациента.

Диспепсия, связанная с повышенной кислотностью

Для облегчения болей и/или устранения ощущений дискомфорта в эпигастральной области, с изжогой или без изжоги, назначают препарат Омепразол-Акрихин 20 мг 1 раз в сутки. Терапевтический эффект может достигаться при дозе 10 мг 1 раз в сутки, поэтому лечение можно начинать с этой дозы. Если после 4 недель лечения (омепразол 20 мг 1 раз в сутки) симптомы не исчезают, рекомендуется дополнительное обследование пациента.

Синдром Золлингера-Эллисона

Если у Вас синдром Золлингера-Эллисона, препарат назначают в индивидуальной дозировке. Лечение продолжают по клиническим показаниям настолько долго, насколько это необходимо. Рекомендуемая начальная доза омепразола 60 мг ежедневно. У всех пациентов с тяжелой формой заболевания, а также в тех случаях, когда другие терапевтические методы не привели к желаемому результату, применение препарата было эффективным у более 90 % пациентов

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

при приеме 20–120 мг ежедневно. В тех случаях, когда суточная доза омепразола превышает 80 мг, дозу следует делить на две части и принимать 2 раза в сутки.

Особые группы пациентов

Нарушение функции почек

Если у Вас есть нарушения функции почек, то коррекции дозы препарата Омепразол-Акрихин не требуется.

Нарушение функции печени

Если у Вас есть нарушения функции печени, то уровень омепразола в крови увеличивается. В связи с этим доза 10–20 мг в сутки является достаточной.

Пациенты пожилого возраста

Для пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется.

Применение у детей и подростков

Рефлюкс-эзофагит и симптоматическая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Детям в возрасте старше 2-х лет с массой тела более 20 кг назначают препарат Омепразол-Акрихин в дозе 20 мг 1 раз в сутки. При необходимости возможно увеличение дозы до 40 мг 1 раз в сутки. Рекомендуемая продолжительность лечения в случае рефлюкс-эзофагита составляет 4–8 недель. Рекомендуемая продолжительность лечения в случае симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезни составляет 2–4 недели. Если после 2–4 недель лечения контроль симптомов заболевания не был достигнут, рекомендуется дополнительное обследование пациента.

Язва двенадцатиперстной кишки, вызванная Helicobacter pylori

При выборе схемы терапии следует учитывать официальные национальные, региональные и местные рекомендации, касающиеся резистентности микроорганизмов к антибактериальным средствам, продолжительности терапии (наиболее часто – 7 дней, но в ряде случаев – до 14 дней) и правильного применения антибактериальных препаратов.

Терапию необходимо проводить под наблюдением специалиста.

Для детей в возрасте старше 4 лет рекомендуется следующая схема лечения:

15–30 кг	Омепразол 10 мг, амоксициллин 25 мг/кг и кларитромицин 7,5 мг/кг. Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение недели.
31–40 кг	Омепразол 20 мг, амоксициллин 750 мг и кларитромицин 7,5 мг/кг. Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение недели.
>40 кг	Омепразол 20 мг, амоксициллин 1 г и кларитромицин 500 мг. Все препараты принимать 2 раза в сутки в течение недели.

Путь и (или) способ введения

Внутрь. Капсулы препарата Омепразол-Акрихин рекомендуется принимать утром. Капсулу следует проглотить целиком, запить жидкостью. Капсулы нельзя разжевывать или делить.

Содержимое капсулы можно растворять в воде или слегка подкисленной жидкости, например, во фруктовом соке. Полученный раствор должен быть использован в течение 30 минут. Чтобы

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

быть уверенным в приеме полной дозы, налейте в стакан снова жидкости наполовину, взболтайте и выпейте.

Продолжительность терапии

Препарат Омепразол-Акрихин предназначен для лечения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки. Для уточнения продолжительности приема препарата обратитесь к лечащему врачу.

Если Вы приняли препарата Омепразол-Акрихин больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Омепразол-Акрихин больше, чем предусмотрено, у Вас могут возникнуть следующие симптомы: головокружение, спутанность сознания, апатия, головная боль, расширение (дилатация) сосудов, учащение частоты сердечных сокращений (тахикардия), тошнота, рвота, метеоризм, диарея. Лечение симптоматическое, при необходимости промывание желудка, прием активированного угля.

Если Вы приняли данный препарат в чрезмерном количестве, немедленно сообщите об этом своему врачу или работнику аптеки, либо обратитесь в приемное отделение ближайшей больницы. Может потребоваться принять внутрь активированный уголь. Не забудьте взять с собой упаковку препарата Омепразол-Акрихин или этот листок-вкладыш.

Если Вы забыли принять лекарственный препарат Омепразол-Акрихин

Вы должны использовать лекарственный препарат с частотой, назначенной Вам лечащим врачом, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если Вы забыли принять препарат, не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную капсулу. Примите обычную дозу препарата Омепразол-Акрихин, как только вспомните. Затем примите следующую дозу в обычное время. Однако, если почти пришло время для приема следующей дозы, не принимайте дозу, которую Вы пропустили.

Если Вы прекратили прием препарата Омепразол-Акрихин

Не прекращайте лечение, назначенное лечащим врачом.

Важно окончить курс лечения, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите принимать препарат, симптомы заболевания могут возвратиться или ухудшиться.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Омепразол-Акрихин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Омепразол-Акрихин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- Если у Вас появился зуд, покраснение кожи с появлением пузырей и волдырей. Это может означать, что у вас аллергическая реакция в виде крапивницы. Такие серьезные проблемы требуют неотложной медицинской помощи.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- Если у Вас появился отек лица, губ или горла, из-за которого трудно глотать, дышать или у Вас появились хрипы или стеснение в груди, а также зуд и сыпь на коже. Это

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

может означать, что у Вас тяжелая аллергическая реакция. Такие серьезные проблемы требуют неотложной медицинской помощи.

- Если у Вас появилось предобморочное состояние или произошла потеря сознания, резкое снижение артериального давления, нарушение дыхания, кожа стала холодной, влажной и бледно-синюшного цвета, это может означать, что у Вас анафилактический шок. Такие серьезные проблемы требуют неотложной медицинской помощи.
- Если у Вас появились затруднение дыхания, свистящие хрипы и удушье, это может означать, что у Вас бронхоспазм. Такие серьезные проблемы требуют неотложной медицинской помощи.
- Если у Вас появились признаки лихорадки с колебаниями температуры от 38 °С до 40 °С, кореподобные высыпания на коже, сначала на лице и верхней части туловища, которые затем распространяются на нижние конечности, отек век и лица, это может означать, что у Вас лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром). Такие серьезные проблемы требуют неотложной медицинской помощи.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- Если у Вас появилась сыпь на коже в виде круглых кольцевидных пятен с фиолетовой центральной частью и розовым венчиком, расположенных на туловище и конечностях, на ладонях и стопах, на слизистой оболочке полости рта, это может означать, что у Вас мультиформная эритема. Такие серьезные проблемы требуют неотложной медицинской помощи.
- Если у Вас на любом участке кожи появляются волдыри, шелушение или кровянистые выделения с зудящей неровной сыпью или без нее, с отслойкой участков кожи; может затрагивать Ваши губы, глаза, рот, нос, гениталии, руки или ноги; при этом могут быть симптомы, похожие на грипп – высокая температура, боль в горле, недомогание, это может означать, что у Вас синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз. Такие серьезные проблемы требуют неотложной медицинской помощи.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Омепразол-Акрихин

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- боль в животе;
- тошнота и/или рвота;
- понос;
- запор;
- повышенное газообразование (метеоризм).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- бессонница;
- головокружение;
- ощущение жжения, покалывания, ползания «мурашек» (парестезии);
- сонливость;
- головокружение, связанное с заболеванием уха (вертиго);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- повышение активности «печеночных» ферментов;
- кожная сыпь;
- кожный зуд;
- воспаление кожи (дерматит);
- переломы бедра, костей запястья, позвонков;
- повышенное потоотделение.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- снижение количества лейкоцитов (лейкопения);
- снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения);
- снижение количества натрия (гипонатриемия);
- возбуждение;
- депрессия;
- спутанность сознания;
- нарушение вкуса;
- нечеткость зрения;
- сухость во рту;
- воспаление слизистой оболочки полости рта (стоматит);
- грибковое заболевание желудочно-кишечного тракта (кандидоз желудочно-кишечного тракта);
- воспаление слизистой оболочки толстого кишечника (микроскопический колит);
- воспаление печени (гепатит (с желтухой или без));
- выпадение волос (алопеция);
- реакции фоточувствительности в виде покраснения кожи после пребывания на солнце;
- боль в суставах (артралгия);
- боль в мышцах (миалгия);
- заболевание почек (интерстициальный нефрит);
- недомогание;
- периферические отеки.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- снижение количества гранулоцитов (агранулоцитоз);
- уменьшение количества всех элементов крови (панцитопения);
- агрессия;
- галлюцинации;
- печеночная недостаточность;
- заболевания головного мозга (энцефалопатия у пациентов с предшествующими тяжелыми заболеваниями печени);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- мышечная слабость;
- увеличение грудных желез у мужчин (гинекомастия).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- повышение количества эозинофилов (эозинофилия);
- снижение магния в крови (гипомагниемия);
- появление на коже шеи, верхней части туловища и плечах красных кольцевидных пятен или бляшек с мелкими чешуйками, напоминающих псориаз (подострая кожная красная волчанка);
- заболевание почек с возможным прогрессированием до почечной недостаточности (развитие острого тубулоинтерстициального нефрита);
- импотенция (эректильная дисфункция).

Сообщалось о случаях образования железистых кист в желудке у пациентов, принимающих препараты, понижающие секрецию желез желудка, в течение длительного промежутка времени; кисты доброкачественные и проходят самостоятельно на фоне продолжения терапии.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Омепразол-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в сухом месте, при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Омепразол-Акрихин содержит

Действующим веществом является омепразол.

Каждая капсула содержит 20 мг омепразола.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: натрия гидрофосфат (натрия фосфат двузамещенный), натрия лаурилсульфат, лактозы моногидрат, кукурузный крахмал, маннитол, сахароза (Sugar#35#40), сахароза (Sugar Regular), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), пропиленгликоль, натрия гидроксид, цетиловый спирт, метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1], полисорбат-80, титана диоксид.

Состав корпуса капсулы: титана диоксид, железа оксид желтый, желатин.

Состав крышечки капсулы: титана диоксид, железа оксид желтый, железа оксид черный, индиготин, желатин.

Препарат Омепразол-Акрихин содержит лактозы моногидрат, сахарозу, натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Омепразол-Акрихин и содержимое упаковки

Капсулы кишечнорастворимые.

Твердые желатиновые двухцветные капсулы № 1: корпус желтовато-кремового цвета с крышечкой темно-зеленого цвета. Содержимое капсул – пеллеты от белого до почти белого цвета.

По 10 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

1, 2, 3, 4, 5 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.04.2026 № 8437
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).