ЛП-№(002810)-(РГ-RU) от 27.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

Листок-вкладыш - информация для пациента

Мелоксикам-Акрихин, 10 мг/мл, раствор для внутримышечного введения

Действующее вещество: мелоксикам

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Мелоксикам-Акрихин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин.
3. Применение препарата Мелоксикам-Акрихин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Мелоксикам-Акрихин.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Мелоксикам-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Мелоксикам-Акрихин содержит действующее вещество мелоксикам. Мелоксикам относится к фармакотерапевтической группе под названием: «противовоспалительные и противоревматические препараты; нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты; оксикамы». Мелоксикам применяется для уменьшения воспаления и боли в суставах и мышцах.

Показания к применению

Препарат Мелоксикам-Акрихин показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет для стартовой терапии и краткосрочного симптоматического лечения при:

- хроническом заболевании, вызывающим повреждение хрящей и окружающих их тканей, сопровождающемся болью (остеоартрит (артроз, дегенеративные заболевания суставов));
- хроническом воспалении суставов, особенно кистей и стоп, которое сопровождается отеком, болью и зачастую разрушением суставов (ревматоидный артрит);
- хроническом воспалительном заболевании позвоночника и суставов, которое характеризуется срастанием позвонков и ограничением подвижности (анкилозирующий спондилит);
- других воспалительных и дегенеративных заболеваниях костно-мышечной системы, таких как заболевания суставов (артропатии), заболевания костно-мышечной системы спины (дорсопатии) (например, боль по ходу седалищного нерва (ишиас), боль внизу спины, заболевание плечевого сустава и окружающих его тканей (плечевой периартрит) и другие), сопровождающихся болью.

Способ действия препарата Мелоксикам-Акрихин

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

Мелоксикам обладает обезболивающим и противовоспалительным действием за счет угнетения активности фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Механизм действия мелоксикама состоит в его способности ингибировать синтез простагландинов – веществ, вызывающих боль и воспаление в суставах. Мелоксикам не оказывает отрицательного влияния на хрящевую ткань.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин

Противопоказания

Не применяйте препарат Мелоксикам-Акрихин:

- если у Вас аллергия на мелоксикам или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас аллергия на другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП);
- если у Вас была ранее или имеется аллергия на ацетилсалициловую кислоту или на другие нестероидные противовоспалительные препараты, которая проявляется в виде: свистящего дыхания, стеснения в груди, одышки (бронхиальная астма); заложенности носа из-за отека слизистой оболочки носа (носовые полипы); зудящих пятен (крапивница); внезапного отека кожи или слизистых оболочек, например отека вокруг глаз, лица, губ, рта или горла, возможно затруднение дыхания (ангионевротический отек);
- если у Вас эрозии и/или язвы слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки) в стадии обострения или недавно перенесенные;
- если у Вас воспалительные заболевания кишечника - болезнь Крона или язвенный колит в стадии обострения;
- если у Вас серьезное заболевание печени (тяжелая печеночная недостаточность);
- если у Вас серьезное заболевание сердца (тяжелая сердечная недостаточность);
- если у Вас серьезное заболевание почек (тяжелая почечная недостаточность в условиях отсутствия гемодиализа (очищение крови с помощью аппарата «искусственная почка»), при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин (показатель выраженного снижения работы почек), а также при подтвержденной гиперкалиемии (повышенный уровень калия в крови));
- если у Вас активное заболевание печени (прогрессирующее разрушение клеток печени);
- если у Вас кровотечение в желудке или кишечнике;
- если Вы недавно перенесли кровоизлияние в головном мозге;
- если у Вас заболевания, связанные с нарушением свертывания крови;
- у детей в возрасте до 18 лет;
- если Вы беременны;
- если Вы кормите ребенка грудью;
- если Вы недавно перенесли операцию шунтирования коронарных артерий;
- если Вы принимаете препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты).

Особые указания и меры предосторожности

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

Перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщите врачу, если у Вас есть, были в прошлом или возникнут во время лечения препаратом следующие заболевания или состояния:

- заболевания желудочно-кишечного тракта (наличие инфекции *Helicobacter pylori* – бактерии, вызывающей заболевания желудка);
- хроническая сердечная недостаточность (состояние, проявляющееся одышкой, повышенной утомляемостью, хрипами в легких, отеками голеней и стоп);
- почечная недостаточность (клиренс креатинина 30–60 мл/мин, состояние, проявляющееся отсутствием или снижением мочеиспускания, отеками, тошнотой, рвотой, слабостью, спутанностью сознания);
- ишемическая болезнь сердца (состояние, проявляющееся появлением давящей боли за грудиной);
- цереброваскулярные заболевания (заболевания сосудов головного мозга, приводящие к нарушению кровообращения);
- дислипидемия/гиперлипидемия (нарушение нормального соотношения липидов в крови/повышенное содержание липидов в крови);
- сахарный диабет (заболевание, при котором наблюдается стойкое повышение уровня глюкозы в крови);
- сопутствующая терапия следующими препаратами: антикоагулянты (препараты для снижения свертывания крови), пероральные глюкокортикостероиды (гормональные препараты для приема внутрь для лечения аллергических и воспалительных заболеваний), антиагреганты (препараты для предупреждения образования тромбов), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (препараты для лечения депрессии) (см. раздел 2. «Другие препараты и препарат Мелоксикам-Акрихин»);
- заболевания периферических артерий (сужение или закупорка сосудов, чаще всего ног, из-за холестериновых бляшек, приводящее к кислородному голоданию тканей; появляются боли/судороги в мышцах при ходьбе, проходящие в покое);
- пожилой возраст;
- длительное применение НПВП;
- Вы курите;
- Вы часто употребляете алкоголь.

При возникновении боли в области живота, изжоги, тошноты, рвоты, метеоризма (вздутия живота вследствие скопления газов), тяжести в желудке, при наличии следов крови в каловых массах или стула черного цвета необходимо немедленно прекратить применение мелоксикама и обратиться к лечащему врачу.

При возникновении тяжелых кожных реакций, сопровождающихся высокой температурой тела, болью и отеком в горле, сильным зудом, образованием пузырей и шелушением кожи, и кровотечением из губ, глаз, рта, носа (эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз), необходимо немедленно прекратить применение мелоксикама и обратиться к лечащему врачу или в ближайшее отделение экстренной медицинской помощи. Развитие этих реакций возможно в течение первого месяца лечения препаратом, хотя в редких случаях может развиться и позже.

Перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин сообщите врачу, если у Вас после применения мелоксикама или других оксикамов (например, пироксикама), развилась фиксированная лекарственная сыпь (пятна круглой или овальной формы с покраснением и

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

припухлостью кожи, которые при повторном приеме препарата появляются в прежних местах высыпания, волдыри, крапивница, зуд).

При применении НПВП повышается риск развития тяжелых заболеваний сердца и сосудов (тромбозов, инфаркта миокарда, приступа стенокардии, возможно со смертельным исходом). Перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин сообщите врачу, если у Вас ранее были тяжелые заболевания сердца и сосудов (тромбозы (образование сгустков крови (тромбов) в венах или артериях, блокирующее кровоток), инфаркт миокарда (опасное для жизни состояние, вызванное острой нехваткой кровоснабжения сердечной мышцы (ишемией) и отмиранием ее участка), приступы стенокардии (давящие боли за грудиной из-за нехватки кислорода сердцу, обычно при нагрузке)) или у Вас есть к ним предрасположенность.

Перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин сообщите врачу, если у Вас имеются или были в прошлом любые проблемы со стороны почек. Если у Вас имеется скрыто протекающая почечная недостаточность, применение препарата может привести к обострению. Вероятность развития данных обострений резко увеличивается при наличии следующих факторов риска: пожилой возраст; хроническая сердечная недостаточность и обезвоживание; цирроз печени; массивная потеря белка с мочой, сопровождающаяся отеками (нефротический синдром); острые нарушения функции почек; одновременное применение препаратов разных групп для снижения артериального давления; серьезные хирургические вмешательства, которые ведут к уменьшению объема циркулирующей крови (гиповолемии). Если описанные факторы риска касаются Вас сообщите об этом врачу, который назначит дополнительный контроль функции почек.

Перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин сообщите врачу, если Вы принимаете мочегонные препараты для снижения артериального давления или лечения сердечной недостаточности. Совместное применение с мелоксикамом может снизить эффективность этих препаратов, и, как следствие, привести к повышению артериального давления и усилению признаков сердечной недостаточности (одышки и отеков). Контролируйте уровень артериального давления и обращайтесь к врачу при появлении и одышки или отеков.

Перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин сообщите врачу, если у Вас наблюдается ослабленное состояние или Вы истощены. Вам необходимо тщательное наблюдение врача, так как Вы можете хуже переносить нежелательные явления.

Перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин сообщите врачу, если у Вас имеется инфекционное заболевание. Подобно другим НПВП, препарат Мелоксикам-Акрихин может маскировать (скрывать) симптомы основного инфекционного заболевания.

Перед применением препарата Мелоксикам-Акрихин сообщите врачу, если Вы планируете ребенка. Мелоксикам влияет на способность к зачатию, и, возможно, Вам потребуется отмена препарата (см. раздел 2. «Беременность, грудное вскармливание и фертильность»).

Во время лечения препаратом Мелоксикам-Акрихин сообщите врачу, если у Вас наблюдается изменение показателей в биохимическом анализе крови (повышение уровня трансаминаз). В большинстве случаев эти изменения бывают небольшими и проходящими. Если изменения существенны, Ваш врач может отменить препарат и назначить дополнительный контроль данных показателей.

Дети

Препарат противопоказан детям в возрасте от 0 до 18 лет (см. раздел 2. «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат Мелоксикам-Акрихин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

В особенности, сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете следующие препараты:

- глюкокортикостероиды (препараты для лечения воспалительных или аллергических заболеваний, например, преднизолон, дексаметазон);
- ацетилсалициловую кислоту (препарат, применяемый для уменьшения образования тромбов, а также для снижения температуры тела при лихорадке);
- антикоагулянты для приема внутрь (препараты для разжижения крови, например, варфарин);
- гепарин для системного применения (препарат для разжижения крови в виде инъекций);
- тромболитические средства (препараты для разрушения сгустков крови (тромбов) в сосудах, например, стрептокиназа, алтеплаза);
- ингибиторы обратного захвата серотонина (препараты для лечения депрессии, например, флуоксетин, сертралин, пароксетин);
- препараты лития (препарат для лечения депрессии);
- метотрексат (применяется для подавления иммунной системы, противоопухолевое средство);
- внутриматочные контрацептивы (средства для предупреждения нежелательной беременности, например, противозачаточная спираль);
- диуретики (мочегонные препараты, например, индапамид, спиронолактон);
- гипотензивные препараты (препараты, снижающие артериальное давления, например, бисопролол, эналаприл, нифедипин, индапамид, валсартан, лозартан);
- колестирамин (препарат для лечения атеросклероза);
- пеметрексед (противоопухолевый препарат);
- циклоспорин (применяется для подавления иммунной системы);
- производные сульфонилмочевины (например, глибенкламид, гликлазид), натеглинид (препараты для лечения сахарного диабета);
- пробенецид (препарат для лечения подагры);

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

В исследованиях на животных обнаружена репродуктивная токсичность (неблагоприятное влияние на развитие потомства). Применение НПВП у женщин, находящихся в 3 триместре беременности может вызывать врожденные пороки плода (преждевременное заращение артериального протока, патологию почек). При применении НПВП у женщин с 20-й недели беременности возможно развитие маловодия и/или патологии почек у новорожденных (неонатальная почечная дисфункция).

Не применяйте препарат Мелоксикам-Акрихин во время беременности (см. раздел 2. «Противопоказания»).

Грудное вскармливание

Известно, что НПВП (к которым относится мелоксикам) проникают в грудное молоко.

Не применяйте препарат Мелоксикам-Акрихин в период грудного вскармливания (см. раздел 2. «Противопоказания»).

Фертильность

Мелоксикам может оказывать влияние на фертильность, и поэтому не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Мелоксикам может приводить к задержке овуляции.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

В связи с этим у женщин, имеющих проблемы с зачатием и проходящим обследование по поводу подобных проблем, рекомендуется отмена препарата (см. раздел 2. «Особые указания и меры предосторожности»).

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Мелоксикам оказывает слабое влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

При управлении автомобилем и работе с механизмами Вы должны принимать во внимание возможность развития головокружения, сонливости, нарушения зрения или других нарушений со стороны центральной нервной системы. В период лечения Вам необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Поэтому убедитесь, что Вы знаете, как Вы реагируете на препарат, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат Мелоксикам-Акрихин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну ампулу объемом 1,5 мл, то есть, по сути, «не содержит натрия».

3. Применение препарата Мелоксикам-Акрихин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Ваш лечащий врач подберет необходимые для Вас дозу препарата и длительность лечения. Так как потенциальный риск нежелательных реакций зависит от дозы и продолжительности лечения, следует использовать максимально возможные низкие дозы и длительность применения.

Рекомендуемая доза

Максимальная однократная доза: 7,5 мг.

Максимальная суточная доза: 15 мг.

Остеоартрит с болевым синдромом: 7,5 мг в сутки. При необходимости, Ваш лечащий врач может увеличить дозу до 15 мг в сутки.

Ревматоидный артрит: 15 мг в сутки. При необходимости, Ваш лечащий врач может снизить дозу до 7,5 мг в сутки.

Анкилозирующий спондилит: 15 мг в сутки. При необходимости, Ваш лечащий врач может снизить дозу до 7,5 мг в сутки.

Особые группы пациентов

Пациенты с повышенным риском нежелательных реакций (НР)

Если у Вас в прошлом были заболевания желудочно-кишечного тракта, имеются факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется начинать лечение с дозы 7,5 мг в сутки.

Пациенты с почечной недостаточностью

Если у Вас выраженная почечная недостаточность, находитесь на гемодиализе, доза не должна превышать 7,5 мг в сутки.

При слабой или умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина более 25 мл/мин) коррекции дозы не требуется.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

Пациенты с печеночной недостаточностью

Если у Вас начальная стадия цирроза печени коррекции дозы не требуется.

Путь и (или) способ введения

Для внутримышечного введения.

Препарат вводится посредством глубокой внутримышечной инъекции.

Препарат нельзя вводить внутривенно.

Учитывая возможную несовместимость, Мелоксикам-Акрихин, раствор для внутримышечного введения не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

Препарат может вводить только опытный медицинский персонал.

После вскрытия ампулы препарат можно использовать только один раз. Весь оставшийся лекарственный препарат и отходы следует уничтожить в установленном порядке.

Комбинированное применение

Не применяйте препарат Мелоксикам-Акрихин совместно с другими НПВП.

Суммарная суточная доза мелоксикама, применяемого в виде разных лекарственных форм, не должна превышать 15 мг.

Продолжительность терапии

Внутримышечное введение препарата показано только в течение первых нескольких дней терапии. В дальнейшем лечение продолжают с применением лекарственных форм для приема внутрь.

Если Вы применили препарата Мелоксикам-Акрихин больше, чем следовало

Препарат вводится только медицинским персоналом, поэтому маловероятно, чтобы Вы получили большее количество препарата, чем это необходимо.

После применения большей, чем рекомендуемая доза препарата могут появиться: сонливость, нарушение сознания, тошнота, рвота, боли в животе, кровотечение в желудок и/или кишечник, тяжелое нарушение функции почек, изменения артериального давления, остановка дыхания, остановка сердечной деятельности.

Если Вы считаете, что получили дозу препарата выше, чем рекомендованная, немедленно сообщите об этом врачу или медицинской сестре. Вам будет оказана необходимая медицинская помощь.

Если Вы забыли применить препарат Мелоксикам-Акрихин

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата Мелоксикам-Акрихин

Не прекращайте применение препарата Мелоксикам-Акрихин, не посоветовавшись с врачом.

Важно окончить курс лечения, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите применять препарат слишком рано, симптомы заболевания могут возвратиться или ухудшиться.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

Прекратите применение препарата Мелоксикам-Акрихин **и немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих симптомов **серьезных нежелательных реакций:**

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- рвота с кровью, стул черного цвета, мелена, кровавая рвота (скрытое или явное желудочно-кишечное кровотечение);
- отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, горла, сопровождающийся зудом, сыпью (ангиоотек);
- нарушения мочеиспускания, включая острую задержку мочи.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- снижение или изменение количества различных типов клеток крови, установленное по анализу крови (лейкопения, тромбоцитопения, изменение числа клеток крови или лейкоцитарной формулы);
- затруднение дыхания, кашель, одышка, свистящее дыхание, стеснение в груди, посинение кожи, охриплость голоса (бронхиальная астма у пациентов с аллергией к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП);
- тяжелые кожные реакции, сопровождающиеся высокой температурой тела, болью, сильным зудом, образованием пузырей и шелушением кожи, кровотечением из губ, глаз, рта, носа (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- образование дефекта в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта с появлением острой, резко нарастающей боли в верхней части живота и быстро нарастающей слабости (перфорация ЖКТ);
- образование на коже заполненных жидкостью пузырьков (буллезный дерматит);
- папулезная сыпь в виде «мишени» или двухцветных пятен (многоформная эритема);
- отсутствие или снижение мочеиспускания, отеки, тошнота, рвота, слабость, спутанность сознания (острая почечная недостаточность).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- предобморочное состояние или потеря сознания, снижение артериального давления, нарушение дыхания, бледно-синюшная, холодная, влажная кожа (анафилактический шок, анафилактоидные реакции).

Другие нежелательные реакции:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- боль в животе, ощущение боли и/или дискомфорта в животе (диспепсия), понос (диарея), тошнота, рвота;
- боль и отек в месте введения.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- снижение концентрации гемоглобина и количества эритроцитов в крови (анемия);
- прочие аллергические реакции, которые развиваются в течение 15–20 минут (другие реакции гиперчувствительности немедленного типа);
- головокружение;
- сонливость;
- ощущение вращения окружающих предметов вокруг тела (вертиго);
- повышение артериального давления;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

- чувство «прилива» крови к лицу;
- воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит);
- воспаление слизистой оболочки полости рта (стоматит);
- запор;
- вздутие живота;
- отрыжка;
- изменения показателей функции печени в анализе крови (например, повышение активности трансаминаз или концентрации билирубина);
- зуд, кожная сыпь;
- изменения показателей функции почек (повышение уровня креатинина, и/или мочевины в сыворотке крови);
- поздняя овуляция;
- отеки.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- изменение настроения;
- воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит);
- нарушения зрения, включая нечеткость зрения;
- шум в ушах;
- сердцебиение;
- дефект стенки желудка и двенадцатиперстной кишки (гастродуоденальные язвы);
- воспаление слизистой оболочки толстой кишки (колит);
- воспаление слизистой оболочки пищевода (эзофагит);
- белые или красные, набухшие, зудящие высыпания на коже (крапивница).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- воспаление печени (гепатит).

Неизвестно (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- спутанность сознания;
- дезориентация;
- повышенная чувствительность кожи к солнечному свету (фотосенсибилизация);
- кожная аллергическая реакция, известная как фиксированная лекарственная сыпь, которая при повторном воздействии препарата обычно появляется в прежних местах высыпания и может выглядеть как пятна круглой или овальной формы с покраснением и отеком кожи, образованием волдырей, крапивница, зуд;
- бесплодие у женщин.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375 (17) 242 00 29

Факс: +375 (17) 242 00 29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rceth.by/

5. Хранение препарата Мелоксикам-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и ампуле после «Годен до:».

Датой истечения срока годности считается последний день данного месяца.

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Мелоксикам-Акрихин содержит

Действующим веществом является мелоксикам.

Каждый мл раствора для внутримышечного введения содержит 10 мг мелоксикама. Каждая ампула (1,5 мл) содержит 15 мг мелоксикама.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: меглюмин, гликофурол, полоксамер 188, натрия хлорид, глицин, натрия гидроксид, вода для инъекций.

Внешний вид препарата Мелоксикам-Акрихин и содержимое упаковки

Раствор для внутримышечного введения.

Прозрачный раствор желтого или зеленовато-желтого цвета с характерным запахом.

По 1,5 мл раствора в ампулы из бесцветного стекла типа I, вместимостью 2 мл с кодирующим кольцом зеленого цвета, нанесенным на поверхность ампулы. На шейку ампулы в месте разлома нанесена насечка и точка белого цвета над ней.

По 3 или 5 ампул в контурную ячейковую упаковку.

По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Польша

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски

Телефон: +48 58 5631600

Факс: +48 58 5622353

Адрес электронной почты: phv@polpharma.com

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Республика Беларусь

ООО «АКРИХИН БиУай»

220005, г. Минск, ул. Веры Хоружей, д.4, пом.17

Телефон: +375 17 368 59 98

Адрес электронной почты: office@akrikhin.by

Торговые наименования препарата в странах ЕАЭС

Российская Федерация – Мелоксикам-Акрихин

Республика Беларусь – Мелоксипол

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.

(линия отрыва или отреза)

Следующие сведения предназначены исключительно для медицинских работников:

Режим дозирования

Рекомендуемая доза составляет 7,5 мг или 15 мг 1 раз в сутки, в зависимости от интенсивности болей и тяжести воспалительного процесса.

Остеоартрит с болевым синдромом: 7,5 мг в сутки. При необходимости эта доза может быть увеличена до 15 мг в сутки.

Ревматоидный артрит: 15 мг в сутки. В зависимости от лечебного эффекта эта доза может быть снижена до 7,5 мг в сутки.

Анкилозирующий спондилит: 15 мг в сутки. В зависимости от лечебного эффекта эта доза может быть снижена до 7,5 мг в сутки.

Так как потенциальный риск нежелательных реакций (НР) зависит от дозы и продолжительности лечения, следует использовать максимально возможные низкие дозы и длительность применения. Максимальная рекомендуемая суточная доза – 15 мг.

Особые группы пациентов

Пациенты с повышенным риском нежелательных реакций (НР)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0014)

У пациентов с повышенным риском НР (заболевания желудочно-кишечного тракта в анамнезе, наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний) рекомендуется начинать лечение с дозы 7,5 мг в сутки.

Пациенты с почечной недостаточностью

У пациентов с выраженной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, доза не должна превышать 7,5 мг в сутки.

У пациентов со слабой или умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина более 25 мл/мин) коррекции дозы не требуется.

Пациенты с печеночной недостаточностью

У пациентов с циррозом печени (компенсированным) коррекции дозы не требуется.

Дети

Безопасность и эффективность препарата Мелоксикам-Акрихин у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют. Препарат Мелоксикам-Акрихин противопоказан у детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Способ применения

Для внутримышечного введения.

Препарат вводится посредством глубокой внутримышечной инъекции.

Препарат нельзя вводить внутривенно.

Учитывая возможную несовместимость, Мелоксикам-Акрихин, раствор для внутримышечного введения не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

После вскрытия ампулы препарат можно использовать только один раз. Весь оставшийся лекарственный препарат и отходы следует уничтожить в установленном порядке.

Внутримышечное введение препарата показано только в течение первых нескольких дней терапии. В дальнейшем лечение продолжают с применением пероральных лекарственных форм.

Комбинированное применение

Не следует применять препарат одновременно с другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Суммарная суточная доза мелоксикама, применяемого в виде разных лекарственных форм, не должна превышать 15 мг.

Передозировка

Симптомы

Вероятно, будут присутствовать симптомы, свойственные передозировке НПВП, в тяжелых случаях: сонливость, нарушения сознания, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, желудочно-кишечное кровотечение, острая почечная недостаточность, изменения артериального давления, остановка дыхания, асистолия.

Лечение

Антидот не известен. В случае передозировки препарата следует применять симптоматическую терапию. Известно, что колестирамин ускоряет выведение мелоксикама.